

ДЕРЖАВНА САНТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо застосування засобу
«Жавель-Клейд» (таблетки)
виробництва фірми «Hydrachim» (Франція)
з метою дезінфекції та дестерилізаційного очищення

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні:
САНТАРНИЙ ЩІТ УКРАЇНИ®



(044) 404-04-54
(044) 404-90-27

Київ-2016

Організація-роздрібник:

Державна установа «Інститут медицини праці Академії медичних наук України» за участю ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит України».

Методичні вказівки призначені для закладів та установ охорони здоров'я, інших організацій, в яких проводяться роботи з дезінфекцією.

Закладам та установам охорони здоров'я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у необхідній кількості примірників.



Цей документ охороняється згідно із Законом «Про охорону авторських та суміжних прав».

Цей документ не може бути повністю або частково відтворений, тиражований чи розповсюджений без дозволу ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит України».

Методи, режими застосування та інші відомості, викладені в цих Методичних вказівках, розповсюджуються виключно на засіб «Жавель-Клейд» (таблетки).

Методи, режими застосування та інші відомості, викладені в цих Методичних вказівках, визначені на основі випробувань конкретно засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) виробництва фірми «Hydrachim» (Франція).

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України



С.В. Протас

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо застосування засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) виробництва фірми «Hydrachim» (Франція) з метою лезінфекцій та дестерпітазійного очищення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва засобу: дезінфекційний засіб «Жавель-Клейд» (таблетки).

1.2. Виробник засобу: фірма «Hydrachim» (Франція).

1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – 80-82 (діюча речовина); адіпінова кислота, карбонат натрію (допоміжні речовини). Допоміжні речовини зв'язують та стабілізують діючу речовину, підвищують її антимікробну дію, забезпечують високу розчинність засобу, пом'якшують воду, знижують фіксуючу та корозійну активність хлору. За потребою замовника до складу засобу може бути доданий ароматизатор.

1.4. Форма випуску, фізико-хімічні властивості засобу та розчинів засобу: засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) є концентрованим, випускається у вигляді таблеток білого кольору вагою 3,3-3,6 г, що добре розчиняється у воді. Таблетки можуть мати на поверхні насічки для ділення таблетки на частини при приготуванні робочих розчинів. Засіб містить 45±3% активного хлору, при цьому вміст активного хлору в одній таблетці знаходиться в межах 1,47-1,62 г. Хлор як класичний окислювач справляє не тільки потужну антимікробну дію, а і руйнує забруднення, органічні сполуки та забарвлюючі речовини. Адіпінова кислота, що регулює pH розчинів, і карбонат натрію, що протидіє ефекту іонів «жорсткості», підсилюють змочувальні та мийні властивості водних розчинів засобу. Водні розчини засобу:

- прозорі, безбарвні, зі слабким запахом хлору, стійкі;
 - пом'якшують воду, мають змочувальні та миючі властивості, видалюють білкові, жирові, механічні забруднення, залишки крові, залишки лікарських засобів із зовнішніх поверхонь, внутрішніх каналів і порожнин виробів медичного призначення;
 - не викликають корозії (корозійна дія робочих розчинів засобу на металеві поверхні та вироби не перевищує дії води, використаної для їх приготування);
 - не пошкоджують об'єкти з корозійностійких металів (у т.ч. з низьковуглецевої сталі, нікельованих металів), скла, силікону, гуми на основі силиконового та натурального каучуку, полімерних матеріалів, фарбованого та нефарбованого дерева, кахлю, лінолеуму, бетону, порцеляни, фаянсу та поверхні апаратів, приладів, устаткування з гальванічним, лакофарбовим і полімерним покриттям, не знебарвлюють пофарбовані поверхні;
 - не провокують і не посилюють виділення летючих хімічних речовин з поверхонь, що обробляються;
 - не фіксують білкові забруднення на поверхні виробів медичного призначення;

Цей документ охороняється згідно із Законом «Про охорону авторських та супільних прав» і не може бути повністю або частково відтворений, тиражований чи розповсюджений без дозволу ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит України».

- добре змиваються мінімальною кількістю води, не залишають плям і нальоту;
- гомогенізують мокротиння та інші видлення.

Засіб не горить, вибухобезпечний, сумісний з милами, сульфованими маслами, аніонними поверхнево-активними речовинами, амфoterними та неіоногенними речовинами, солями лужних металів неорганічних і органічних кислот.

1.5. Спектр антимікробної дії засобу: засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) виявляє антимікробні властивості щодо грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу, псевдотуберкульозу, легінельозу, дизентерії, інших колітів, ентерітів, гастроenterітів, черевного тифу, паратифу, інших сальмонелльозів, кишкових ієрсиніозів, дифтерії, склератини, коклюшу, менінгококової інфекції, золотистого стафілококу, мультирезистентного стафілококу (MRSA), клостириді, ентерогеморагічну кишкову паличку (*Escherichia coli*), синьогінну паличку тощо), вірусів (включаючи збудників вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, грипу, Avian influenza («пташиного грипу»), Swine influenza («свинячого грипу»), SARS («атипової пневмонії»), геморагічних лихоманок, віруси вакцин, Кокасі, ЕСНО, герпесу, цитомегалії, парагрипу, збудників аденовірусної, ентеровірусної, коронавірусної, поліовірусної, паповавірусної, рестіраторно-синтиціальні, риновірусної, ротавірусної, хантавірусної інфекцій тощо), грибів роду *Candida*, патогенних дерматофітів, збудників внутрішньошлікарнічних інфекцій, пліснявих грибів та спор, збудників особливо небезпечних інфекцій (чума, холера, туляремія, сибирська візразка), а також ефективний у знищенні та попередженні появи плісняви. Засіб має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб (цитіст та ооцист найпростіших, яєць та личинок гельментів, гостриків).

1.6. Токсичність та безпечності засобу: засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) за параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 належить до III класу помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок, до IV класу мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру та при парентеральному введенні. У сухому вигляді (таблетки) в насичуючих концентраціях пари відноситься до IV класу мало небезпечних засобів. В умовах інгаляційної дії у вигляді пари належить до IV класу мало небезпечних речовин за ступенем леткості. Засіб не має шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії, не виявляє кумулятивних, гонадотропних, ембріотропних, ембріотоксичних, канцерогенних, мутагенних і тератогенних властивостей.

Робочі розчини засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації до 0,3% (за активним хлором) включно в умовах одноразової аппікації не спричиняють місцево-подразнюючою дією на шкіру та слизові оболонки очей. При багаторазовому нанесенні спричиняють сухість і пущення шкіри. При застосуванні робочих розчинів засобу будь-якої концентрації методом зрошення, а також розчинів концентрації вище 0,1% (за активним хлором) методом протиріння може спостерігатися подразнення органів дихання та слизових оболонок очей.

Робочі розчини засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації до 0,03% (за активним хлором) включно не залишають слідів діючої та допоміжних речовин у жовтку та білку товарних (харчових) яєць при дезінфекції поверхонь шкаралупи яєць методом занурення яєць в розчин, зрошення та аерозольної обробки поверхонь шкаралупи яєць розчином засобу, не впливають на харчові та поживні якості яєць, добре змиваються з поверхонь шкаралупи яєць.

Хімічні сполуки, які можуть утворюватись під час взаємодії робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) та синтетичних складових оброблюваних поверхонь, є безпечною для здоров'я та життя персоналу, що здійснює роботи з дезінфекції, працюючих та сторонніх осіб, не мають віддалених наслідків для здоров'я.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБУ

2.1. Дезінфекційний засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) призначений для застосування за напрямками, передбаченими нижче.

2.2. Профілактична, поточна та заключна дезінфекція, поточні та генеральні прибирання в закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, вогнищах інфекційних захворювань: лікарнях, поліклініках, стоматологічних і косметологічних клініках, гостіліях, амбулаторіях, диспансерах, санаторіях, профілакторіях, реабілітаційних центрах, денних стаціонарах, медико-санітарних частинах і пунктах, фельдшерських та

фельдшерсько-акушерських пунктах, пологових стаціонарах, центрах з трансплантації органів, медичних профільних центрах, на станціях і рухомому складі швидкої та невідкладної медичної допомоги, включаючи клінічні, діагностичні, імунологічні, біохімічні, бактеріологічні, вірусологічні та серологічні лабораторії (центрі), донорські пункти та відділення переливання крові, карети швидкої та невідкладної медичної допомоги, хірургічні, гінекологічні, акушерські, дитячі, терапевтичні, фізіотерапевтичні, патологоанатомічні відділення тощо.

Профілактична дезінфекція в закладах та на об'єктах, перелічених у цьому пункті Методичних вказівок, у т.ч. профілактична дезінфекція санітарного транспорту, проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами згідно з таблицею 2.

Поточна та заключча дезінфекція в закладах та на об'єктах, перелічених у цьому пункті Методичних вказівок, при інфекціях бактеріальної етіології (включаючи туберкульоз, псевдотуберкульоз, легіонельоз, дизентерію, інші коліти, ентерити, гастроenterити, черевний тиф, паратифи, інші сальмонельози, кишкові ієрсиніози, дифтерію, скарлатину, коклюш, менингококову інфекцію, золотистий стафілокок, мультирезистентний стафілокок (MRSA), інфекції, викликані клостридіями, ентерогеморагічною кишковою паличкою (*Escherichia coli*), синьогнойною паличкою тощо), інфекціях вірусної етіології (включаючи вірусні гепатити, ВІЛ-інфекцію, грип, Avian influenza («пташиний грип»), Swine influenza («свинячий грип»), SARS («китайська пневмонія»), геморагічні лихоманки, вакцину, інфекції, викликані вірусами Коксакі, ЕСНО, герпес, цитомегалію, парагрип, аденоівірусні, ентеровірусні, коронавірусні, полівірусні, паповавірусні, респіраторно-синтіціальні, риновірусні, ротавірусні, хантавірусні інфекцій тощо), інфекціях грибкової етіології (кандидози, дерматомікози), внутрішньоолікарніяних інфекціях, пліснявих грибах та спорах, особливо небезпечних інфекціях (чума, холера, туляремія, сибріска виразка), а також дезінфекція санітарного транспорту після перевезення інфекційних хворих проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами відповідних інфекцій згідно з таблицями 2-7.

Поточні та генеральні прибирання в закладах та на об'єктах, перелічених у цьому пункті Методичних вказівок, проводяться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами згідно з таблицею 8.

2.3. Профілактична, поточна та заключча дезінфекція, поточні та генеральні прибирання в аптечних закладах (аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски, аптечні склади), дитячих, навчально-виховних закладах різних видів акредитації, закладах соціального захисту, геріатричних закладах, місцях постійного та тимчасового проживання (приватні оселі, гуртожитки, готелі, кемпінги), офісах, спортивно-оздоровчих комплексах, місцях проведення спортивних змагань і тренувань, басейнах, аквапарках, саунах, лазнях, на об'єктах комунально- побутового призначення (перукарні, салони краси, косметологічні, масажні, манікюрні, педікюрні салони та кабінети, солярій, салони ліпсингу і татуювання, пральні, хімчистки тощо), в адміністративних і громадських закладах та будівлях, банківських установах, закладах зв'язку, закладах культури та відпочинку, готельного та ресторанного господарства, торгівлі, місцях масового скупчення людей (базари, ринки, вокзали, стоянки, стадіони, майдани тощо), громадських туалетах (у т.ч. біотуалетах), на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчопереробної промисловості, підприємствах і об'єктах водопостачання та водовідведення, підприємствах агропромислового комплексу, промислових підприємствах, у санпропускниках, складах і сховищах (включаючи паперові архіви, бібліотечні сховища, приміщення для зберігання зерна, продуктів харчування, лікарських засобів, предметів гігієни та інших товарів), на підприємствах з транспортування, сортування та переробки сміття, рухомому складі та об'єктах забезпечення автомобільного транспорту (включаючи пасажирський, санітарний, транспорт для перевезення харчових продуктів, транспорт для прибирання сміття тощо), метрополітену, запізничного, водного, наземних об'єктах повітряного транспорту, в умовах надзвичайних ситуацій, на об'єктах та у підрозділах цивільної оборони, міністерств оборони, надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ (у т.ч. в казармах), митниці та прикордонних служб, інших міністерств, служб і відомств, установ пенітенціарної системи, на інших епідемічно значимих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт у відповідності до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів.

Профілактична дезінфекція, поточні та генеральні прибирання в закладах та на об'єктах, перелічених у цьому пункті Методичних вказівок, проводяться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за наступними режимами:

- поверхонь та об'єктів у приміщеннях, де висока вірогідність поширення грибкових інфекцій (санитарпусники, переодягальні, душові, приміщення «чаш» басейнів, водних атракціонів в аквапарках, парилні в саунах і лазнях, масажні кабінети тощо) – за режимами згідно з таблицею 4 або таблицею 12;

- поверхонь та об'єктів у приміщеннях, де висока вірогідність поширення пліснявих грибів і спор (приміщення для зберігання, вагони та контейнери для перевезення коренеплодів, зерна тощо) – за режимами згідно з таблицею 6;

- в усіх інших випадках (за винятком установ пенітенціарної системи) – за режимами згідно з таблицею 2.

Профілактична дезінфекція, поточні та генеральні прибирання в установах пенітенціарної системи проводяться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за наступними режимами:

- поверхонь та об'єктів у приміщеннях, де висока вірогідність поширення туберкульозу (камери утримання та інші місця перебування в'язнів) – за режимами згідно з таблицею 3;

- в усіх інших випадках – за режимами згідно з таблицею 2.

Поточна та заключна дезінфекція в закладах та на об'єктах, перелічених у цьому пункті Методичних вказівок (при виявленні інфекційного хворого, підозрі на інфекційне захворювання або під час епідемії), проводяться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами відповідних інфекцій згідно з таблицями 2-7.

2.4. Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищеннем, виробів медичного призначення (за винятком ендоскопів та інструментів до них), стоматологічного, перукарського, косметологічного, манікюрного, педікюрного інструментарію, аптечного та лабораторного посуду, скла проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з п. 4.2.14, таблицею 9.

2.5. Заповнення дезінфекційних бар'єрів для обмивання (змочування) взуття та дезінфекційних бар'єрів для занурення надітіх на руки рукавичок (пластикових, латексних, гумових) проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з п. 4.2.20.

2.6. Обробка поверхонь з метою знищення та попередження появи плісняв проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з п. 4.2.21.

2.7. Знезараження (дезінвазія) об'єктів (ґрунту, майданчиків з твердим покриттям, поверхонь приміщень, предметів обстановки, предметів вжитку, іграшок, лабораторного посуду, скла, обладнання тощо), **контамінованих збудниками паразитарних хвороб** (цистами та ооцистами найпростіших, яйцями та личинками гельмінтів, гостриків), проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з п. 4.2.22.

2.8. Дезінфекція аерозольним методом повітря у приміщеннях, поверхонь приміщень та об'єктів у приміщеннях за допомогою термооприскувачів (туманогенераторів), моторозпилювачів або ранцевих (ручних) оприскувачів проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з відповідною інструкцією за її наявності.

2.9. Знезараження води, дезінфекція систем і окремих об'єктів водопостачання при централізованому, автономному та нецентралізованому (місцевому) водопостачанні; **знезараження стічних вод, дезінфекція систем і окремих об'єктів водовідведення** проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з п. 4.2.23, таблицею 10 та/або відповідною інструкцією за її наявності.

2.10. Знезараження води при нецентралізованому водопостачанні, води для приготування харчового льоду, дезінфекція фруктів, овочів, смисностей для води, систем подачі води проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з пп. 4.2.23, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, таблицями 10-11.

2.11. Дезінфекція колодязів та знезараження господарсько-питної води децентралізованих джерел водопостачання (шахтні колодязі тощо) проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з відповідною інструкцією за її наявності.

2.12. Дезінфекція об'єктів у спортивно-оздоровчих закладах, басейнах, аквапарках, саунах, лазнях та зиозараження води в плавальних басейнах, водних атракціонах, гідромасажних ваннах, джакузі проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з пп. 4.2.27, 4.2.28, таблицями 12-13.

2.13. Дезінфекція та санітарна обробка обладнання, посуду, тари, інвентарю, поверхонь приміщень, транспортних засобів тощо на підприємствах харчопереробної промисловості, незалежно від форми власності та підпорядкування (підприємствах м'ясної, консервної, птахопереробної, яичної, рибної, молочної, масложирової, плодовоочевої, сирної, кондитерської, хлібопекарської промисловості, підприємствах з виготовлення продуктів дитячого харчування, напоїв, вирощування грибів тощо) проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з п. 4.2.29, таблицями 14-20 та/або відповідними інструкціями за її наявності.

2.14. Дезінфекція поверхонь шкарапали товарних (харчових) яєць проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з п. 4.2.30, таблицею 21.

2.15. Антисептування сировини, напівпродуктів, технологічних вод, дезінфекція виробничого обладнання та комунікацій на підприємствах цукрової галузі проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з відповідною інструкцією за її наявності.

2.16. Антисептування сировини і технологічних середовищ, дезінфекція виробничого обладнання та комунікацій у виробництві спирту з цукровісної і крохмалевісної сировини проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з відповідною інструкцією за її наявності.

2.17. Профілактична дезінфекція вагонів пасажирських поїздів у пунктах формування та обороту при підготовці їх до рейсу та на шляху прямування; електропоїздів та дизель-поїздів; вантажних вагонів та контейнерів, призначених для перевезення продовольчої продукції; приміщень та окремих об'єктів залізничних вокзалів (станцій) проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами згідно з таблицею 2 та відповідними інструкціями за їх наявності.

3. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

3.1. Методика та умови приготування робочих розчинів: робочі розчини засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) готують у спеціально виділених промаркованих ємностях шляхом розчинення таблеток у воді відповідно до розрахунків, наведених в таблиці 1.

При приготуванні робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) таблетки легко розчиняються у воді, не потребують її підігріву, додавання допоміжних речовин, додаткового посилення або попередньої активізації, а також обмежень щодо матеріалу ємностей.

3.2. Розрахунки для приготування робочих розчинів: для приготування робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) відповідної концентрації виходять із розрахунків, наведених у таблиці 1.

3.3. Покращення миючих властивостей робочих розчинів: для покращення миючих властивостей до робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) можна додавати 0,5% миючого засобу із розрахунку 5 мл (5 г) на 1 л розчину (якщо інше не рекомендується для конкретного миючого засобу) або розчинити відповідну кількість засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) у 0,5%-му розчині миючого засобу, дозволеного до застосування в Україні.

Додавання 0,5% миючого засобу (розчинення таблеток у 0,5%-му розчині миючого засобу) не знижує антимікробну активність робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки).

3.4. Повторне застосування робочих розчинів: робочі розчини засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) можна застосовувати багаторазово при позитивних результатах хімічно-аналітичного визначення вмісту активного хлору в розчині (або після доведення його до норми – формули 3-4), за відсутності механічного забруднення та зміни початкового зовнішнього вигляду розчину (відсутність помутніння, осаду, забарвлення тощо), але не довше строку придатності розчину.

3.5. Строк придатності та умови зберігання робочих розчинів: строк придатності робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) до застосування – 15 діб за умови зберігання в закритих ємностях у затемненому місці.

Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки)

Концентрація робочого розчину (за активним хлором), %	Необхідна кількість для приготування робочого розчину		Концентрація робочого розчину (за активним хлором), %	Необхідна кількість для приготування робочого розчину	
	таблеток	води, л		таблеток	води, л
0,0025	1	60	0,1	7	10
0,004	1	37,5	0,15	10	10
0,01	1	15	0,2	14	10
0,015	1	10	0,3	20	10
0,03	2	10	2,0	134	10
0,045	3	10	3,0	200	10
0,06	4	10	5,0	334	10

4. ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ

4.1. Об'єкти застосування: засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) застосовується для дезінфекції та знезараження об'єктів, перелічених нижче, дезінфекції та суміщення процесів дезінфекції з дестерилізаційним очищеннем виробів медичного призначення (за винятком ендоскопів та інструментів до них), стоматологічного, перукарського, косметологічного, манікюрного, педікюрного інструментарію, аптечного та лабораторного посуду, скла:

- поверхні приміщень (підлога, стіни, стеля, двері, підвіконня, віконні рами, ручки дверей, вікон тощо), у т.ч. в кухонних зонах переробки та приготування продуктів харчування, підсобних приміщеннях (переодягальні, душові, санвузли), тверді меблі, поверхні побутової техніки, кухонного та холодильного обладнання, транспортних засобів;
- поверхні медичних та інших апаратів, пристрій, устаткування з гальванічним, лакоафаровим і полімерним покриттям;
- технологічне обладнання та емності на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної промисловості, промислових підприємствах;
 - вентиляційні системи та кондиціонери, у т.ч. їх деталі;
 - м'які меблі (дивани та крісла з тканинною обивкою тощо), килими, м'які іграшки;
 - санітарно-технічне обладнання (унітази, раковини, крани, душове обладнання, ванни, зокрема, ванни для бальнеологічних процедур, гідромасажні ванни, джакузі тощо), накопичувальні баки та поверхні автономних туалетів і біотуалетів, сміттєпроводи, сміттєві баки, сміттєвози, обладнання для збирання та переробки відходів і сміття;
 - кухонний та столовий посуд, емності для зберігання харчових продуктів (у т.ч. одноразовий посуд, емності);
 - білизна (у т.ч. натільна та постільна), одяг (у т.ч. спеціальний, медичний, захисний);
 - візки, тара для складання та транспортування, стелажі для зберігання білизни, одягу;
 - взуття зі шкіри та інших матеріалів, банні сандалії, капці, гумові та поліпропіленові килимки, гумові рукавички та інше з гуми, пластмас, синтетичних матеріалів;
 - тверді іграшки (пластмасові, гумові, металеві, дерев'яні тощо), спортивний інвентар;
 - вироби медичного призначення (за винятком ендоскопів та інструментів до них), стоматологічний, перукарський, косметологічний, манікюрний, педікюрний інструментарій із корозійностійких металів (у т.ч. з низьковуглецевої сталі, нікельованих металів), скла, силікону, гуми на основі сіліконового та натурального каучуку, полімерних матеріалів тощо;

- предмети догляду хворих та особистої гігієни (грілки, міхури для льоду, наконечники для спринцівок, клізми, підкладні клейонки, термометри, греображені, щітки для рук і ніг тощо);
- аптечний і лабораторний посуд, скло (пробірки, піпетки, скляні та дерев'яні палички, предметні та покривні скельця, циліндри, колби, флакони, хімічні склянки, чашки Петрі, планшети для імунологічного аналізу, гумові груші, шланги тощо);
- медичні відходи (використані вироби медичного призначення, включаючи ампули та шприци після проведення вакцинацій, інструменти, лабораторний посуд одноразового використання), відпрацьований матеріал (перев'язувальні матеріали, ватні тампони, серветки, шапочки, маски, накидки, одноразова білизна тощо), що підлягають утилізації;
- контейнери для збору та утилізації медичних відходів, відпрацьованого матеріалу;
- прибиральний інвентар (ганчір'я, швабри, щітки, йоржі, відра, совки тощо), предмети для миття посуду (губки, щітки, йоржі тощо);
- посуд з-під видіlenь (плівальниці, судна, горшки тощо), ємності з-під біологічних рідин і відходів (крові, сироватки, плазми, ліквору, фекалій, сечі, фекально-сечової суміші, блювотних мас, мокротиння, слизу, слини, жовчі, залишки їжі, промивних і змивних вод);
- біологічні та інші контаміновані відходи (кров, у т.ч. донорська, згустки крові, сироватка, плазма, ліквор, фекалій, сеча, фекально-сечова суміш, блювотні маси, мокротиння, у т.ч. в плівальницях, слиз, слина, жовч, осад стічних вод, залишки їжі, промивні води після полоскання зіву, змивні води після миття хворого тощо);
- укомплектування аптечок (епідукладок) в лікувально-профілактичних закладах;
- заповнення дезінфекційних бар'єрів для обмивання (змочування) взуття та дезінфекційних бар'єрів для занурення надітих на руки рукавичок (пластикових, латексних, гумових);
- обробка поверхонь з метою знищення та попередження появи плісняви;
- знезараження (дезінвазія) об'єктів (ґрунту, майданчиків з твердим покриттям, поверхонь приміщень, предметів обстановки, предметів вжитку, іграшок, лабораторного посуду, скла, обладнання тощо), контамінованих збудниками паразитарних хвороб (пистами та ооцистами найпростіших, яйцями та личинками гельмінтів, гостриків);
- знезараження води при централізованому, автономному та нецентралізованому (місцевому) водопостачанні, води для приготування харчового льоду, дезінфекція фруктів, овочів, ємностей для води, систем подачі води у стоматологічних установках, плавальнích басейнах, водних атракціонах, гідромасажних ваннах, джакузі тощо;
- дезінфекція об'єктів у спортивно-оздоровчих закладах, басейнах, акваларках, саунах, лазнях та знезараження води в плавальніх басейнах, водних атракціонах, гідромасажних ваннах, джакузі;
- дезінфекція та санітарна обробка технологічного та торговельного обладнання, посуду, виробничої та зворотної тарі, інвентарю, поверхонь виробничих та інших приміщень, транспортних засобів тощо на підприємствах харчопереробної промисловості;
- дезінфекція поверхонь шкаралупи товарних (харчових) яєць;
- дезінфекція та знезараження інших об'єктів із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами, наведеними у відповідних інструкціях: дезінфекція аерозольним методом повітря у приміщеннях, поверхонь та об'єктів у приміщеннях; знезараження води, дезінфекція систем і окремих об'єктів водопостачання при централізованому, автономному та нецентралізованому (місцевому) водопостачанні; знезараження стічних вод, дезінфекція систем і окремих об'єктів водовідведення; дезінфекція колодязів та знезараження води в них; антисептування сировини, напівпродуктів, технологічних вод, дезінфекція виробничого обладнання та комунікацій на підприємствах цукрової та спиртової галузей;
- дезінфекція об'єктів із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами, наведеними у цих Методичних вказівках і відповідних інструкціях: дезінфекція вагонів пасажирських поїздів; електропоїздів та дизель-поїздів; вантажних вагонів та контейнерів, призначених для перевезення продовольчої продукції; приміщень та окремих об'єктів залізничних вокзалів (станцій).

4.2. Методи дезінфекції окремих об'єктів: засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) застосовують у вигляді робочих розчинів методами протирання, чищення, зрошення розчином, занурення у розчин, замочування у розчині, заповнення або заливання розчином тощо, а також у сухому вигляді методами засипання засобом або додавання засобу.

4.2.1. Поверхні приміщень (підлога, стіни, стелі, двері, підвіконня, віконні рами, ручки дверей, вікон тощо), у т.ч. в кухонних зонах переробки та приготування продуктів харчування, підсобних приміщеннях (переодягальні, душові, санузли), тверді меблі, поверхні побутової техніки, кухонного та холодильного обладнання, транспортних засобів протирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати робочого розчину складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці. Після закінчення дезінфекції паркетну підлогу, меблі з дерева, у тому числі поліровані, протирають сухим ганчір'ям для запобігання деформації дерев'яних поверхонь під дією вологи.

4.2.2. Поверхні медичних та інших апаратів, приладів, устаткування з гальванічним, лакофарбовим і полімерним покриттям протирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином засобу з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати робочого розчину складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці.

4.2.3. Технологічне обладнання та емності на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної промисловості, промислових підприємствах заповнюють робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), протирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу, або зрошують робочим розчином засобу з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати робочого розчину при протиранні та зрошенні складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці. Після закінчення дезінфекції технологічне обладнання та емності промивають водою, якщо це передбачено технологічним процесом.

4.2.4. Вентиляційні системи та кондиціонери в нерозібраному стані, вимкнені та при можливості від'єднані від електро живлення дезінфікують наступним чином: зовнішні поверхні (трубопроводи, короби, зовнішні решітки, поверхні в зоні витяжних вентиляційних отворів, панелі та жалюзі внутрішніх блоків кондиціонерів тощо) протирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином засобу з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати робочого розчину складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці. При дезінфекції вентиляційних систем і кондиціонерів необхідно дотримуватися техніки безпеки та слідкувати за тим, щоб влага не потрапила до електричних блоків обладнання.

При обслуговуванні вентиляційних систем і кондиціонерів, якщо таке виконується спеціалістами та передбачає розбирання обладнання, зняті деталі спочатку очищають від пилу та бруду, а потім дезінфікують наступним чином:

- великі за площею деталі (зовнішні панелі, інші частини корпусів, пластини теплообмінників тощо) протирають або зрошують робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) із розрахунку витрати робочого розчину 100 мл/м² поверхні;

- нерозірні деталі, з'єднані з електричними блоками (лопаті нерозірніх вентиляторів тощо), обережно, не допускаючи попадання вологи в електричні блоки, протирають робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) із розрахунку 100 мл/м² поверхні;

- невеликі за площею деталі, не з'єднані з електричними блоками (решітки, фільтри, трубки теплообмінників, зняті лопаті вентиляторів тощо) занурюють у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), після закінчення дезінфекції промивають проточною водою.

4.2.5. М'які меблі (дивани та крісла з тканиною обивкою тощо), **килими, м'які іграшки** очищають від пилу за допомогою пилососу та, при необхідності, обробляють із застосуванням дозволених засобів для миття та чищення. Після цього об'єкти дезінфікують методом чищення щіткою, змоченою у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошення з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати розчину складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці. Після закінчення дезінфекції м'які іграшки очищають від залишків розчину щітками, змоченими у водопровідній воді, та висушують.

4.2.6. Санітарно-технічне обладнання (унітази, раковини, крані, душове обладнання, ванни, зокрема, ванни для бальнеологічних процедур, гідромасажні ванни, джакузі тощо), **накопичувальні баки та поверхні автономних туалетів і біотуалетів**, **сміттєпроводи, сміттєві баки, сміттєвози, обладнання для збирання та переробки відходів і сміття** протирають ганчір'ям або чистять щіткою (йоржем), змоченими у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином засобу з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. При необхідності (сильному забрудненні об'єктів) проводять дворазову обробку з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції. Норма витрати робочого розчину складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці, на одну обробку. Після закінчення дезінфекції санітарно-технічне обладнання, поверхні автономних туалетів і біотуалетів оброблюють водопровідною водою.

4.2.7. Кухонний та столовий посуд, ємності для зберігання харчових продуктів (у т.ч. одноразовий посуд, ємності) при можливості звільняють від залишків їжі та повністю занурюють у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за норми витрати розчину 2 л на 1 комплект столового посуду (глибока та мілка тарілки, чашка, блюдце, столова і чайна ложки, виделка, ніж) або в кількості, необхідній для повного занурення об'єктів дезінфекції. Після закінчення дезінфекції посуд та ємності для харчових продуктів промивають проточною питною водою протягом 3-х хвилин, одноразовий посуд та ємності утилізують.

4.2.8. Білизну (у т.ч. натільну та постільну), одяг (у т.ч. спеціальний, медичний, захисний), за винятком вовняніх, шовкових і виготовлених із синтетичних волокон, поштучно повністю замочують у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) із розрахунку 4 л розчину на 1 кг сухої білизни, одягу. Ємність із змоченими у розчині білизною, одягом закривають кришкою. Після закінчення дезінфекції білизну, одяг перуть і полощуть.

Засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) також застосовують для дезінфекції білизни та одягу перед пранням або в процесі прання у пральних машинах, промислових пральних системах. Для цього спочатку визначають необхідну кількість засобу, виходячи з норми витрати робочого розчину (4 л на 1 кг сухої білизни, одягу) та режиму дезінфекції (згідно з таблицями 2-4 і 7), а потім здійснюють дезінфекцію одним із методів:

- білизну, одяг завантажують у пральну машину або промислову пральну систему, засипають необхідну кількість засобу у відсік для прального порошку (без прального порошку), додають трохи води до засобу, вимикують режим попереднього прання (т воді - не вище 30 °C, експозиція - не менше 10 хвилин), потім - режим виполітсування, після чого засипають пральний порошок і вимикують режим основного прання;

- в окремій ємності виготовляють концентрований розчин засобу (необхідну кількість засобу розчиняють у невеликій кількості води) та подають цей розчин у пральну машину або промислову пральну систему під час прання, на етапі дезінфекції (т воді - не вище 30 °C, експозиція - не менше 10 хвилин).

Візки, іншу тару для складання та транспортування, стелажі для зберігання білизни, одягу протирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином засобу з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати робочого розчину складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці.

4.2.9. Взуття зі шкіри та інших матеріалів, бавовні савдалі, капці, гумові та поліпропіленові килимки, гумові рукавички та інше з гуми, пластмас, синтетичних матеріалів дезінфікують методами протирання, зрошення робочим розчином або занурення у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки). При зануренні вживають заходів для недопущення спливання об'єктів дезінфекції на поверхню, ємності із зануреними у розчин об'єктами щільно закривають кришками. Після закінчення дезінфекції об'єкти дезінфекції промивають проточною водою.

4.2.10. Тверді іграшки (пластмасові, гумові, металеві, дерев'яні тощо), **спортивний інвентар** дезінфікують методами протирання, зрошення робочим розчином або занурення у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки). При зануренні вживають заходів для недопущення спливання об'єктів дезінфекції на поверхню, ємності із зануреними у розчин об'єктами щільно закривають кришками. Після закінчення дезінфекції об'єкти дезінфекції промивають проточною водою.

4.2.11. Вироби медичного призначення (за винятком ендоскопів та інструментів до них), стоматологічний, перукарський, косметологічний, манікюрний, педікюрний інструментарій із корозійностійких металів (у т.ч. з низьковуглецевої сталі, нікельованих металів), скла, силікону, гуми на основі силіконового та натурального каучуку, полімерних матеріалів тощо (далі – «вироби») дезінфікують в нержавіючих сталевих, емальованих (без пошкодження емалі), скляних або пластмасових ємностях, які щільно закриваються кришками.

Вироби, призначенні для виконання лікувальних, діагностичних, косметологічних, манікюрних, педікюрних процедур, пов’язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок, занурюють у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) одразу після їх використання. Роз’ємні вироби занурюють у розчин у розібраному стані. Вироби, які мають замкові частини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними кілька робочих рухів у робочому розчині для кращого проникнення розчину у важкодоступні ділянки виробів. Крізь голки прокачують робочий розчин. Вироби, які мають канали, звільнняють від повітря, заповнюють розчином усі канали та порожнини, використовуючи допоміжні засоби (шприци, піпетки тощо). Під час дезінфекції канали та порожнини виробів повинні бути повністю (без повітряних пробок) заповнені розчином засобу. Товщина шару розчину над виробами повинна бути не менше 1 см. Після закінчення дезінфекції вироби промивають проточною водою протягом 3-х хвилин.

Для дезінфекції виробів та частин виробів, призначених для виконання процедур, не пов’язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок, допускається дворазове, з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції, протирання ганчір’ям, змоченим у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошення робочим розчином з пульверизатора. Після закінчення дезінфекції вироби промивають проточною водою протягом 3-х хвилин.

4.2.12. Предмети догляду хворих та особистої гігієни (грілки, міхури для льоду, наконечники для спринцовок, клізми, підкладні клейонки, термометри, гребінці, щітки для рук і ніг тощо) із корозійностійких металів (у т.ч. з низьковуглецевої сталі, нікельованих металів), скла, силікону, гуми на основі силіконового та натурального каучуку, полімерних матеріалів тощо занурюють у ємність з робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або протирають ганчір’ям, змоченим у робочому розчині засобу, або зрошують робочим розчином. При зануренні вживають заходів для недопущення спливання об’єктів дезінфекції на поверхню, ємності із зануреними у розчин об’єктами щільно закривають кришками. Після закінчення дезінфекції предмети догляду хворих та особистої гігієни промивають проточною водою.

4.2.13. Аптечний і лабораторний посуд, скло (пробірки, піпетки, скляні та дерев’яні палички, предметні та покривні скельця, цилінди, колби, флакони, хімічні склянки, чашки Петрі, планшети для імунологічного аналізу, гумові груші, шланги тощо) занурюють у ємність з робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), вживають заходів для недопущення спливання на поверхню об’єктів, які легше води, ємності із зануреними у розчин об’єктами щільно закривають кришками. Після закінчення дезінфекції аптечний і лабораторний посуд, скло промивають проточною водою протягом 3-х хвилин.

4.2.14. Дезінфекцію, суміщену з дестерилізаційним очищеннем, виробів медичного призначення (за винятком ендоскопів та інструментів до них), стоматологічного, перукарського, косметологічного, манікюрного, педікюрного інструментарію, аптечного та лабораторного посуду, скла (далі – «вироби») здійснюють одним з наступних методів:

- механізованим методом за допомогою спеціального обладнання за режимами відповідних інфекцій згідно з таблицями 2-4 і 7;

- ручним методом в нержавіючих сталевих, емальованих (без пошкодження емалі), скляних або пластмасових ємностях, які щільно закриваються кришками, згідно з таблицею 9.

Для дезінфекції, суміщеної з дестерилізаційним очищеннем, ручним методом вироби занурюють у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) одразу після їх використання. Роз’ємні вироби занурюють у розчин у розібраному стані. Вироби, які мають замкові частини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними кілька робочих рухів у робочому розчині для кращого проникнення розчину у важкодоступні ділянки виробів. Крізь голки прокачують робочий розчин. Вироби, які мають канали, звільнняють від повітря, заповнюють розчином усі канали та порожнини, використовуючи допоміжні засоби (шприци, піпетки тощо).

Під час дезінфекції, суміщеної з дестерилізаційним очищенням, канали та порожнини виробів повинні бути повністю (без повітряних пробок) заповнені розчином засобу. Товщина шару розчину над виробами повинна бути не менше 1 см. Після закінчення дезінфекції, суміщеної з дестерилізаційним очищенням, виконують наступні дії:

- промивають кожен виріб у тому ж розчині, в якій вони були занурені, протягом 2-х хвилин за допомогою йоржа або щітки; вироби з гуми та пластмас промивають за допомогою ватно-марлевого тампону або тканинної серветки; замкові частини, канали та порожнини виробів промивають за допомогою шприца безперервного типу дії або електровідсмоктувача;
- обполісують вироби проточною водою протягом 3-х хвилин; замкові частини, канали та порожнини виробів промивають проточною водою за допомогою шприца безперервного типу дії або електровідсмоктувача;
- обполісують вироби дистильованою водою протягом 0,5 хвилини; замкові частини, канали та порожнини виробів промивають дистильованою водою за допомогою шприца безперервного типу дії або електровідсмоктувача;
- висушують вироби.

Розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) можна застосовувати для дестерилізаційного очищення виробів ручним методом багаторазово за відсутності механічного забруднення та змін початкового зовнішнього вигляду розчину (відсутність помутніння, осаду, забарвлення тощо), але не довше строку придатності розчину. При перших ознаках зміни початкового зовнішнього вигляду розчин потрібно замінити.

Якість дестерилізаційного очищення виробів оцінюють шляхом постановки проби на наявність залишкових кількостей крові згідно з методиками, викладеними у чинних в Україні нормативних документах. Контроль підлягає 1% одночасно оброблених виробів одного найменування (але не менше 3-х виробів). При виявленні залишків крові (позитивна проба) вся група виробів, від якої відбирали вироби для контролю, підлягає повторній обробці до одержання негативного результату.

4.2.15. Медичні відходи (використані вироби медичного призначення, включаючи ампули та шприци після проведення вакцинації, інструменти, лабораторний посуд одноразового використання) занурюють у ємність з робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) і цілком закривають кришкою. Після закінчення дезінфекції медичні відходи утилізують.

Відпрацьований матеріал (перев'язувальні матеріали, ватні тампони, серветки, шапочки, маски, накидки, одноразова білизна тощо) збирають в окрему ємність з робочим розчином засобу. Після закінчення дезінфекції відпрацьований матеріал утилізують.

Контейнери для збору та утилізації медичних відходів, відпрацьованого матеріалу дезінфікують методами протиріяння, зрошення, занурення або заповнення робочим розчином.

4.2.16. Прибиральний інвентар (ганчір'я, швабри, щітки, йоржі, відра, совки тощо), **предмети для миття посуду** (губки, щітки, йоржі тощо) занурюють у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), протирають або зрошують робочим розчином засобу. Ємності із зануреними у розчин об'єктами цілком закривають кришками. Після закінчення дезінфекції ганчір'я прополісують і висушують, інші об'єкти дезінфекції промивають проточною водою.

4.2.17. Посуд з під виділень (плівальниці, судна, горшки тощо), ємності з під біологічних рідин і відходів (крові, сироватки, плазми, ліквору, фекалій, сечі, фекально-сечової суміші, блювотних мас, мокротиння, слизу, спіни, жовчі, залишки їжі, промивних вод після полоскання зіву, змивних вод після миття хвого тощо) занурюють у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) або заповнюють робочим розчином засобу. Ємності із зануреними у розчин об'єктами цілком закривають кришками.

4.2.18. Біологічні та інші контаміновані відходи (кров, у т.ч. донорська, згустки крові, сироватка, плазма, ліквор, фекалії, сеча фекально-сечова суміш, блювотні маси, мокротиння, у т.ч. в плівальницях, слиз, спіна, жовч, осад стічних вод, залишки їжі, промивні води після полоскання зіву, змивні води після миття хвого тощо), зібрани у ємність, акуратно, не допускаючи розбризкування, заливають робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) із розрахунку 2 об'єми розчину на 1 об'єм матеріалу, що підлягає знезараженню, за режимами відповідних інфекцій згідно з таблицями 2-4 і 7.

Біологічні та інші контаміновані відходи, зібрани у ємність, можна знезаражувати методом засипання засобом «Жавель-Клейд» (таблетки) у сухому вигляді за режимами згідно з таблицею 5 і таблицею 7 (примітка 4).

Ємності із сумішами (відходами і розчином засобу; відходами і таблетками засобу) пільно закривають кришками. Після знезараження відходів вміст ємностей утилізують.

Біологічні рідини, пролиті на поверхні, акуратно збирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), та занурюють разом з ганчір'ям у ємність із розчином (концентрація робочого розчину та експозиція – згідно з режимами знезараження біологічних та інших контамінованих відходів при відповідних інфекціях, таблиці 2-4 і 7), після знезараження вміст ємності утилізують.

Роботи з прибирання пролитих біологічних рідин виконують з дотриманням правил протипідемічної безпеки (використання засобів індивідуального захисту).

Поверхні, на яких знаходилися пролиті біологічні рідини, у т.ч. при наявності на поверхнях засохлих рідин, протирають чистим ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином засобу.

4.2.19. Для укомплектування аптечок (епідукладок) в лікувально-профілактичних закладах доцільно використовувати засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) в упаковці 6 таблеток, що замінє 3 сошетки по 30 г хлораміну або хлорцину. Для профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією (у разі забруднення кров'ю, біологічними рідинами, біоматеріалами без ушкодження шкіри та при попаданні крові, біологічних рідин, біоматеріалу на халат, одяг) застосовують робочі розчини засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами знезараження крові, біологічних рідин, біоматеріалу та дезінфекції близини, забрудненої кров'ю, видленнями, згідно з таблицею 2.

4.2.20. Заповнення дезінфекційних бар'єрів для обмивання (змочування) взуття з метою попередження занесення в приміщення небезпечних мікроорганізмів; заповнення дезінфекційних бар'єрів для занурення надітіх на руки рукавичок (пластикових, латексних, гумових) здійснюють робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації 0,06% за активним хлором (4 таблетки на 10 л води). Розчин засобу замінюють щоденно або по мірі забруднення.

4.2.21. Для позбавлення від плісняви на поверхнях застосовують робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації 0,1% за активним хлором (7 таблеток на 10 л води). Уражені пліснявою поверхні попередньо механічно очищають від грибкового нальоту, а потім протирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу, або зрошують робочим розчином засобу із розрахунку 100 мл/м² поверхні. Після обробки поверхонь дають розчину висохнути. Обробку повторюють щотижня або при появі ознак плісняви.

Для попередження появи плісняви на поверхнях застосовують робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації 0,015% за активним хлором (1 таблетка на 10 л води) методами протирания або зрошення поверхонь із розрахунку 100 мл/м² поверхні.

4.2.22. Знезараження (дезінвазія) об'єктів, контамінованих збудниками паразитарних хвороб (цистами та ооцистами найпростіших, яйцями та личинками гельмінтів, гостриків), здійснюють за технологією, викладеною у чинних в Україні нормативних документах.

Для знезараження (дезінвазії) ґрунту, контамінованого збудниками паразитарних хвороб, ґрунт запивають робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації 2,0% за активним хлором (14 таблеток на 1 л води) за норми витрати розчину 4 л/м² ґрунту. Експозиція становить 1-3 доби.

Для знезараження (дезінвазії) інших об'єктів, контамінованих збудниками паразитарних хвороб (майданчиків з твердим покриттям, поверхонь приміщень, предметів обстановки, предметів вжитку, іграшок, лабораторного посуду, скла, обладнання тощо), поверхні протирають або зрошують робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації 2,0% за активним хлором (14 таблеток на 1 л води) за норми витрати розчину 1 л/м² поверхні (двічі по 0,5 л/м² з інтервалом 1 година та наступним дотриманням експозиції) або занурюють об'єкти у робочий розчин засобу. Загальна експозиція становить 3 години.

Таблиця 2. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів при кишкових та крапельних інфекціях бактеріальної етології (за винятком туберкульозу), крапельних, кишкових та з парентеральним механізмом передачі збудника інфекцій вірусної етології (етідно з п. 1.5 цих Методичних вказівок)

Об'єкти дезінфекції (знезараження)	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експо- зиція, хв.	Методи дезінфекції ¹⁾
		таблеток	води, л		
1	2	3	4	5	6
Поверхні приміщень, тверді меблі, поверхні побутової техніки, кухонного та холодильного обладнання, медичних та інших апаратів, пристрій, устаткування, транспортних засобів (у т.ч. санітарного транспорту)	0,01 0,015 0,03 0,06 0,1	1 1 2 4 7	15 10 10 10 10	90 60 30 15 10	Протирання або зрошення
Ті самі об'єкти, забруднені кров'ю, виділеннями	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Протирання або зрошення
Технологічне обладнання та емності на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної промисловості, промислових підприємствах	0,01-0,03 ²⁾ 0,01 0,015 0,03 0,06 0,1	1 1 1 2 4 7	15-5 15 10 10 10 10	30 90 60 30 15 10	Заповнення Протирання або зрошення
Вентиляційні системи, кондиціонери ³⁾ :					
- зовнішні поверхні, великі за площею деталі	0,01 0,015	1 1	15 10	90 60	Протирання або зрошення
- нерозбірні деталі, з'єднані з електричними блоками	0,03 0,06	2 4	10 10	30 15	Протирання
- невеликі за площею деталі, не з'єднані з електричними блоками	0,1	7	10	10	Занурення
М'які меблі, килими, м'які іграшки	0,015	1	10	60	Чищення щіткою або зрошення
Санітарно-технічне обладнання, накопичувальні баки та поверхні автономних туалетів і біотуалетів, сміттєпроводи, сміттєві баки, сміттєвози, обладнання для збирання та переробки відходів і сміття	0,015 0,06	1 4	10 10	120 30	Протирання, або зрошення або чищення ⁴⁾
Посуд кухонний та столовий, емності для харчових продуктів (у т.ч. одноразовий посуд, емності):					
- без залишків їжі	0,015	1	10	15	Занурення
- із залишками їжі	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення
Білизна, одяг:					
- не забруднені кров'ю, виділеннями	0,015	1	10	60	Замочування
- забруднені кров'ю, виділеннями	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Замочування

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6
Візки, інша тара для складання та транспортування, стелажі для зберігання білизни, одягу	0,015 0,03	1 2	10 10	60 30	Протирання або зрошення
Взуття зі шкіри та інших матеріалів, банні сандалі, каші, гумові та поліпропіленові килимки, гумові рукавички та інше з гуми, пластмас, синтетичних матеріалів	0,06	4	10	60	Протирання, або зрошення, або занурення
Тверді іграшки, спортивний інвентар	0,015 0,03 0,06	1 2 4	10 10 10	60 30 15	Протирання, або зрошення, або занурення
Вироби медичного призначення, стоматологічний, перукарський, косметологічний, манікюрний, педікюрний інструментарій:					
- призначенні для виконання процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Занурення
- не призначенні для виконання процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Занурення або дворазове протирання, зрошення ⁵⁾
Предмети догляду хворих та особистої гігієни	0,015 0,03	1 2	10 10	60 30	Занурення, або протирання, або зрошення
Аптечний, лабораторний посуд, скло:					
- без бактеріологічного навантаження	0,015	1	10	15	Занурення
- з бактеріологічним навантаженням та після контакту з кров'ю	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення
Медичні відходи, відпрацьований матеріал	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Занурення
Відпрацьований текстильний матеріал (у т.ч. одноразовий одяг), не забруднений кров'ю, виділеннями	0,015 0,03	1 2	10 10	60 30	Занурення
Контейнери для збору та утилізації медичних відходів, відпрацьованого матеріалу	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Протирання, або зрошення, або занурення, або заповнення
Прибиральний інвентар, предмети для миття посуду	0,015 0,03 0,06	1 2 4	10 10 10	60 45 30	Занурення, або протирання, або зрошення
Посуд з-під видіlenь (пловальниці, судна, горшки тощо), ємності з-під біологічних рідин і відходів	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення або заповнення
Поверхні після збору пролитих біологічних рідин	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Протирання або зрошення

Закінчення таблиці 2

1	2	3	4	5	6
Кров, у т.ч. донорська, сироватка, плазма, ліквор, сеча, блювотні маси, мокротиння, у т.ч. в ілювальніцях, слиз, слина, жовч, осад стічних вод, залишки їжі, промивні води після полоскання зіву, змивні води після миття хвогоного	0,2 0,3	14 20	10 10	120 30	Заливання розчином засобу із розрахунку 2 об'єми розчину на 1 об'єм матеріалу
Згустки крові	0,2 0,3	14 20	10 10	240 120	
Фекалії, фекально-сечова суміш	0,2 0,3	14 20	10 10	240 120	

Примітки:

- 1) дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу;
- 2) концентрація розчинів залежить від ступеню забрудненості об'єктів дезінфекції;
- 3) див. п. 4.2.4 цих Методичних вказівок щодо особливостей обробки та застережних заходів;
- 4) при необхідності (сильному забрудненні об'єктів) проводять дворазову обробку з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції;
- 5) дворазову обробку здійснюють з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції.

Таблиця 3. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів при туберкульозі, легіонельозі, чумі, холері, туляремії

Об'єкти дезінфекції (знезароження)	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експо- зиція, хв.	Методи дезінфекції ¹⁾
		таблеток	води, л		
1	2	3	4	5	6
Поверхні приміщень, тверді меблі, поверхні побутової техніки, кухонного та холодильного обладнання, медичних та інших апаратів, приладів, устаткування, транспортних засобів (у т.ч. санітарного транспорту)	0,03 0,06 0,1	2 4 7	10 10 10	120 60 30	Протирання або зрошення
Ті самі об'єкти, забруднені кров'ю, видленнями	0,06 0,1	4 7	10 10	120 60	Протирання або зрошення
Технологічне обладнання та емності на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної промисловості, промислових підприємствах	0,03-0,06 ²⁾	2-4	10	30	Заповнення
	0,03 0,06 0,1	2 4 7	10 10 10	120 60 30	Протирання або зрошення
Вентиляційні системи, кондиціонери ³⁾ :					
- зовнішні поверхні, великі за площею деталі	0,03	2	10	120	Протирання або зрошення
- нерозбірні деталі, з'єднані з електричними блоками	0,06	4	10	60	Протирання
- невеликі за площею деталі, не з'єднані з електричними блоками	0,1	7	10	30	Занурення
М'які меблі, килими, м'які іграшки	0,03 0,06	2 4	10 10	120 60	Чищення щіткою або зрошення

Продовження таблиці 3

1	2	3	4	5	6
Санітарно-технічне обладнання, накопичувальні баки та поверхні автономних туалетів і біотуалетів, сміттєпроводи, сміттєві баки, сміттєвози, обладнання для збирання та переробки відходів і сміття	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Протирання, або зрошення, або чищення ⁴⁾
Посуд кухонний та столовий, ємності для харчових продуктів (у т.ч. одноразовий посуд, ємності):					
- без залишків їжі	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Занурення
- із залишками їжі	0,1 0,2 0,3	7 14 20	10 10 10	120 60 30	Занурення
Білизна, одяг:					
- не забруднені кров'ю, виділеннями	0,06	4	10	30	Замочування
- забруднені кров'ю, виділеннями	0,2 0,3	14 20	10 10	120 30	Замочування
Візки, інша тара для складання та транспортування, стелажі для зберігання білизни, одягу	0,03 0,06 0,1	2 4 7	10 10 10	120 60 30	Протирання або зрошення
Взуття зі шкіри та інших матеріалів, банні сандалії, капці, гумові та поліпропіленові килимки, гумові рукавички та інше з гуми, пластмас, синтетичних матеріалів	0,1	7	10	60	Протирання, або зрошення, або занурення
Тверді іграшки, спортивний інвентар	0,06 0,1	4 7	10 10	30 15	Протирання, або зрошення, або занурення
Вироби медичного призначення, стоматологічний, перукарський, косметологічний, манікюрний, педікюрний інструментарій:					
- зі скла, силікону, гуми, полімерних матеріалів тощо, призначенні для виконання процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення
- з корозійностійких металів, призначенні для виконання процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок	0,1 0,2	7 14	10 10	60 30	Занурення
- не призначенні для виконання процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення або дворазове протирання, зрошення ⁵⁾

Закінчення таблиці 3

1	2	3	4	5	6
Предмети догляду хворих та особистої гігієни	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення, або протирання, або зрошення
Аптечний, лабораторний посуд, скло:					
- без бактеріологічного навантаження	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Занурення
- з бактеріологічним навантаженням та після контакту з кров'ю	0,1 0,2 0,3	7 14 20	10 10 10	120 60 30	Занурення
Медичні відходи, відпрацьований матеріал	0,1 0,3	7 20	10 10	60 30	Занурення
Відпрацьований текстильний матеріал (у т.ч. одноразовий одяг), не забруднений кров'ю, видліннями	0,06	4	10	30	Занурення
Контейнери для збору та утилізації медичних відходів, відпрацьованого матеріалу	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Протирання, або зрошення, або занурення, або заповнення
Прибиральний інвентар, предмети для миття посуду	0,1	7	10	60	Занурення, або протирання, або зрошення
Посуд з-під виділень (плівальниці, судна, горшки тощо), ємності з-під біологічних рідин і відходів:					
- зі скла, кераміки, пластмас тощо	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення або заповнення
- з корозійностійких металів	0,1 0,2	7 14	10 10	60 30	Занурення або заповнення
Поверхні після збору пролитих біологічних рідин	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Протирання або зрошення
Кров, у т.ч. донорська, сироватка, плазма, ліквор, фекапії, сеча, фекально-сечова суміш, блютові маси, мокротиння, у т.ч. в плівальницях, слиз, слина, жовч, осад стічних вод, залишки їжі, промивні води після полоскання зіву, змивні води після миття хвороого		0,2 0,3	14 20	10 10	360 120
Згустки крові	0,3	20	10	360	

Примітки:

¹⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу;²⁾ концентрація розчинів залежить від ступеню забрудненості об'єктів дезінфекції;³⁾ див. п. 4.2.4 цих Методичних вказівок щодо особливостей обробки та застережних заходів;⁴⁾ при необхідності (сильному забрудненні об'єктів) проводять дворазову обробку з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції;⁵⁾ дворазову обробку здійснюють з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції.

Таблиця 4. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів при інфекціях грибкової етіології (кандидози, дерматомікози)

Об'єкти дезінфекції (знезараження)	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експо- зиція, хв.	Методи дезінфекції ¹⁾
		таблеток	води, л		
1	2	3	4	5	6
Поверхні приміщень, тверді меблі, поверхні побутової техніки, кухонного та холодильного обладнання, медичних та інших апаратів, приладів, устаткування, транспортних засобів (у т.ч. санітарного транспорту)	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Протирання або зрошення
Технологічне обладнання та емності на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної промисловості, промислових підприємствах	0,03-0,06 ²⁾	2-4	10	30	Заповнення
- зовнішні поверхні, великі за площею деталі	0,03	2	10	60	Протирання або зрошення
- нерозірвірні деталі, з'єднані з електричними блоками	0,06	4	10	30	Протирання
- невеликі за площею деталі, не з'єднані з електричними блоками					Занурення
М'які меблі, килими, м'які іграшки	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Чищення щіткою або зрошення
Санітарно-технічне обладнання, накопичувальні баки та поверхні автономних туалетів і біотуалетів, сміттєпроводи, сміттєві баки, сміттєвози, обладнання для збирання та переробки відходів і сміття	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Протирання, або зрошення, або чищення ⁴⁾
Посуд кухонний та столовий, емності для харчових продуктів (у т.ч. одноразовий посуд, емності):					
- без залишків їжі	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Занурення
- із залишками їжі	0,1 0,2	7 14	10 10	120 30	Занурення
Білизна, одяг:					
- не забруднені кров'ю, виділеннями	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Замочування
- забруднені кров'ю, виділеннями	0,1 0,2	7 14	10 10	120 60	Замочування

Продовження таблиці 4

1	2	3	4	5	6
Візки, інша тара для складання та транспортування, стелажі для зберігання білизни, одягу	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Протирання або зрошення
Взуття зі шкіри та інших матеріалів, банні сандалі, каші, гумові та поліпропіленові килимки, гумові рукавички та інше з гуми, пластмас, синтетичних матеріалів	0,1	7	10	60	Протирання, або зрошення, або занурення
Тверді іграшки, спортивний інвентар	0,03 0,06 0,1	2 4 7	10 10 10	60 30 15	Протирання, або зрошення, або занурення
Вироби медичного призначення, стоматологічний, перукарський, косметологічний, манікюрний, педікюрний інструментарій:					
- призначенні для виконання процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення
- не призначенні для виконання процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення або дворазове протирання, зрошення ⁵⁾
Предмети догляду хворих та особистої гігієни	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення, або протирання, або зрошення
Аптечний, лабораторний посуд, скло:					
- без бактеріологічного навантаження	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Занурення
- з бактеріологічним навантаженням та після контакту з кров'ю	0,1 0,2	7 14	10 10	120 30	Занурення
Медичні відходи, відпрацьований матеріал	0,1 0,3	7 20	10 10	60 30	Занурення
Відпрацьований текстильний матеріал (у т.ч. одноразовий одяг), не забруднений кров'ю, видліннями	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Занурення
Контейнери для збору та утилізації медичних відходів, відпрацьованого матеріалу	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Протирання, або зрошення, або занурення, або заповнення
Прибиральний інвентар, предмети для миття посуду	0,1	7	10	60	Занурення, або протирання, або зрошення
Посуд з-під видліень (пловальниці, судна, горишки тощо), емності з-під біологічних рідин і відходів	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Занурення або заповнення
Поверхні після збору пролитих біологічних рідин	0,06 0,1	4 7	10 10	60 30	Протирання або зрошення

Закінчення таблиці 4

1	2	3	4	5	6
Кров, у т.ч. донорська, сироватка, плазма, ліквор, фекалії, сеча, фекально-сечова суміш, близькоті маси, мокротиння, у т.ч. в пневмальницях, слиз, слина, жовч, осад стічних вод, залишки їжі, промивні води після полоскання зіву, змивні води після миття хвогою	0,2 0,3	14 20	10 10	360 120	Заливання розчином засобу із розрахунку 2 об'ємів розчину на 1 об'єм матеріалу
Згустки крові	0,3	20	10	360	

Примітки:

¹⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу;²⁾ концентрація розчинів залежить від ступеню забрудненості об'єктів дезінфекції;³⁾ див. п. 4.2.4 цих Методичних вказівок щодо особливостей обробки та застережних заходів;⁴⁾ при необхідності (сильному забрудненні об'єктів) проводять дворазову обробку з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції;⁵⁾ дворазову обробку здійснюють з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції.

Таблиця 5. Режими застосування засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) у сухому вигляді для знезараження біологічних рідин і відходів при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз, легіонельоз, чуму, холеру, туляремію), вірусної та грибкової етології

Об'єкти знезараження	Кількість засобу, таблеток	Об'єм відходів, л	Експозиція, хв.	Методи дезінфекції
				Засипати засобом та перемішати
Кров, у т.ч. донорська, сироватка, плазма, ліквор, промивні води після полоскання зіву, змивні води після миття хвогою	10	1,0	120	
	15	1,0	90	
	25	1,0	60	
	30	1,0	30	
Сеча	1	1,5	60	
	2	1,0	30	

Таблиця 6. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів при пліснявих грибах і спорах (у т.ч. A.蓼е в споровій формі)

Об'єкти дезінфекції	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція, хв.	Методи дезінфекції ¹⁾
		таблеток	води, л		
Поверхні тверді непористі з металу, кераміки, плитки тощо: - незабруднені	0,1	7	10	60	Протирання або зрошення
	0,2	14	10	30	
- забруднені	0,2	14	10	60	Протирання або зрошення
	0,3	20	10	30	
Поверхні з фарбованої деревини: - незабруднені	0,2	14	10	60	Протирання або зрошення
	0,3	20	10	30	
- забруднені	0,3	20	10	60	Протирання або зрошення
Поверхні з нефарбованої деревини: - незабруднені	0,2	14	10	180	Протирання або зрошення
	0,3	20	10	60	
- забруднені	0,3	20	10	180	Протирання або зрошення
Прибиральний матеріал	0,3	20	10	120	Замочування

¹⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу.

Таблиця 7. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів, уражених спорами збудника сибірської виразки¹⁾

Об'єкти дезінфекції (знезараження)	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експо- зиція, хв.	Методи дезінфекції ²⁾
		таблеток	води, л		
1	2	3	4	5	6
Поверхні приміщень, тверді меблі, поверхні медичних та інших апаратів, приладів, устаткування, транспортних засобів (у т.ч. санітарного транспорту), забруднені та не забруднені кров'ю, виділеннями (фекаліями тощо)	2,0 3,0	134 200	10 10	180 120	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання, у т.ч. забруднене кров'ю, виділеннями (фекаліями тощо), накопичувальні баки та поверхні автономних туалетів і біотуалетів, сміттєпроводи, сміттєві баки, сміттєвози, обладнання для збирання та переробки відходів і сміття	2,0 3,0	134 200	10 10	180 120	Дворазове протирання, або зрошення, або чищення ³⁾
Посуд кухонний та столовий, ємності для харчових продуктів (у т.ч. одноразовий посуд, ємності), із залишками та без залишків їжі	5,0	334	10	180	Занурення
Білизна, одяг, забруднені та не забруднені кров'ю, виділеннями (фекаліями тощо)	5,0	334	10	180	Замочування
Візки, інша тара для складання та транспортування, стелажі для зберігання білизни, одягу	2,0	134	10	180	Протирання або зрошення
Взуття зі шкіри та інших матеріалів, гумові рукавички та інше з гуми, пластмас, синтетичних матеріалів	5,0	334	10	180	Протирання, або зрошення, або занурення
Тверді іграшки, спортивний інвентар	5,0	334	10	180	
Вироби медичного призначення, стоматологічний, перукарський, косметологічний, маникюрний, педікорний інструментарій	5,0	334	10	180	Занурення
Предмети догляду хворих та особистої гігієни	5,0	334	10	180	Занурення
Аптечний, лабораторний посуд, скло з бактеріологічним навантаженням та після контакту з кров'ю	5,0	334	10	180	Занурення
Медичні відходи, відпрацьований матеріал	5,0	334	10	180	Занурення
Контейнери для збору та утилізації медичних відходів, відпрацьованого матеріалу	5,0	334	10	180	Протирання, або зрошення, або занурення, або заповнення
Прибиральний інвентар, предмети для миття посуду	5,0	334	10	180	Протирання, або зрошення, або занурення

Цей документ охороняється згідно із Законом «Про охорону авторських та суміжних прав» і не може бути повністю або частково відтворений, перероблений чи розповсюджений без дозволу ТОВ «Торговий дім «Санітарний шик України».

Закінчення таблиці 7

1	2	3	4	5	6
Посуд з-під видільень (плювальниці, судна, горишки тощо), емності з-під біологічних рідин і відходів	5,0	334	10	180	Протирання, або зрошення, або занурення, або заповнення
Поверхні після збору пролитих біологічних рідин	3,0	200	10	120	Протирання або зрошення
Кров, у т.ч. донорська, згустки крові, сироватка, плазма, ліквор, фекалії, сеча, фекально-сечова суміш, блівотинні маси, мокротинна, у т.ч. в плювальницях, слиз, слина, жовч, осад стічних вод, залишки їжі, промивні води після полоскання зіву, змивні води після миття хвогою ⁴⁾	5,0	334	10	360	Заливання розчином засобу із розрахунку 2 об'єми розчину на 1 об'єм матеріалу

Примітки:

¹⁾ роботи з дезінфекції у вогнищах сибірської виразки (у т.ч. приготування та застосування робочих розчинів засобу) необхідно проводити у протичумному костюмі, до комплекту якого входить загальновійськовий протигаз;

²⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу;

³⁾ дворазову обробку здійснюють з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції;

⁴⁾ також можливе занесення біологічних рідин, відходів засобом «Жавель-Клейд» (таблетки) у сухому вигляді методом засипання засобом з наступним перемішуванням із розрахунку 30 таблеток засобу на 1 л біологічних рідин, відходів при експозиції 360 хвилин.

Таблиця 8. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) при проведенні поточних і генеральних прибирань у закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладах, перелічених в п. 2.2 цих Методичних вказівок

Профіль закладу (відділення)	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція, хв.	Методи дезінфекції ¹⁾
		таблеток	води, л		
Соматичні, хірургічні, стоматологічні, акушерські, гінекологічні, урологічні відділення та стаціонари, операційні блоки, пологові зали акушерських стаціонарів, палатні та стерилізаційні відділення, процедурні кабінети, переглядувальні, маніпуляційні кабінети, кабінети функціональної діагностики, фізіотерапії, клінічні лабораторії, інші кабінети, лабораторії	0,01 0,015 0,03 0,06 0,1	1 1 2 4 7	15 10 10 10 10	90 60 30 15 10	Протирання або зрошення
Протитуберкульозні лікувально-профілактичні заклади та відділення	0,03 0,06 0,1	2 4 7	10 10 10	120 60 30	Протирання або зрошення
Інфекційні лікувально-профілактичні заклади	За режимом відповідної інфекції				Протирання або зрошення
Шкірно-венерологічні лікувально-профілактичні заклади	0,03 0,06	2 4	10 10	60 30	Протирання або зрошення
Обробка проти збудників анаеробних інфекцій	0,15	10	10	60	Протирання або зрошення

¹⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу.

Таблиця 9. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції, суміщеної з дестерилізаційним очищеннем, виробів медичного призначення, стоматологічного, перукарського, косметологічного, манікюрного, педікюрного інструментарію, аптечного та лабораторного посуду, скла

Етапи обробки ¹⁾	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		т роб. розчину, °C	Експозиція, хв.
		таблеток	води, л		
При інфекціях бактеріальної (за винятком туберкульозу) та вірусної етіології					
Занурення: вироби, інструментарій, аптечний і лабораторний посуд, скло повністю занурити в робочий розчин засобу, заповнити робочим розчином усі канали та порожнини виробів	0,03 0,06	2 4	10 10	не менше 18	60 30
При туберкульозі, легіонельозі, чумі, холері, туляремії, інфекціях грибкової етіології					
Занурення: вироби, інструментарій, аптечний і лабораторний посуд, скло повністю занурити в робочий розчин засобу, заповнити робочим розчином усі канали та порожнини виробів:					
- вироби, інструментарій зі скла, гуми, силікону, полімерних матеріалів тощо, аптечний і лабораторний посуд, скло, а також металеві вироби, інструментарій, не призначені для виконання процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри, слизових оболонок	0,06 0,1	4 7	10 10	не менше 18	60 30
- металеві вироби, інструментарій, призначений для виконання процедур, пов'язаних з пошкодженням шкіри та слизових оболонок	0,1 0,2	7 14	10 10	не менше 18	60 30
При інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз, легіонельоз, чуму, холеру, туляремію), вірусної та грибкової етіології					
Промивання: промити кожен виріб у тому ж розчині, в який вони були занурені, за допомогою йоржа або щітки; вироби з гуми та пластмас – за допомогою ватно-марлевого тампону або тканиної серветки; замкові частини, канали та порожнини виробів – за допомогою шприца або електровідсмоктувача		Промивання виробів здійснюють у тому ж розчині, в який вони були занурені			2
Обполіскування: обполоснути вироби проточною водою; замкові частини, канали та порожнини виробів промити за допомогою шприца або електровідсмоктувача		Не нормується			3
Обполіскування: обполоснути вироби дистильованою водою; замкові частини, канали та порожнини виробів промити за допомогою шприца або електровідсмоктувача		Не нормується			0,5

¹⁾ обробку можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу.

4.2.23. Знезараження води при централізованому, автономному та нецентралізованому (місцевому) водопостачанні здійснюють із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) методами розчинення необхідної кількості засобу у воді або додавання у воду концентрованого розчину засобу (для виготовлення концентрованого розчину необхідну кількість засобу розчиняють у невеликій кількості води в окремій ємності). Знезараження води проводять з дотриманням ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за режимами згідно з таблицею 10 та/або відповідною інструкцією за її наявності.

При нецентралізованому (місцевому) водопостачанні засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) застосовують для:

- знезараження колодязної, каптажної, артезіанської та іншої (річкової, озерної, ставкової) води, яка має каламутність не більше 9 мг/л, поглинання хлору не більше 8 мг/л, не містить осаду та планктону при температурі від +4°C і вище;
- додаткового знезараження водопровідної води (при її невідповідності за мікробіологічними показниками вимогам до води питного призначення, тривалому зберіганні, ускладнений санітарно-епідеміологічний ситуації тощо);
- знезараження води для приготування харчового льоду.

Для **знезараження води, яка не потребує очищення** (прозора і безбарвна кішодязна, каптажна, артезіанська тощо), додаткового **знезараження водопровідної води** необхідну кількість засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) розчиняють у воді з розрахунку 2-6 мг активного хлору на 1 л води або виготовляють концентрований розчин засобу та додають його у воду. Необхідну кількість засобу визначають відповідно до об'єму води, що підлягає знезараженню, згідно з таблицею 10. Вміст залишкового вільного хлору у воді повинен становити 0,3-0,5 мг/л через 30 хвилин після розчинення таблеток або введення концентрованого розчину. Воду, яка не потребує очищення та відповідає за санітарно-хімічними показниками вимогам до води питного призначення, у т.ч. водопровідну воду, після знезараження засобом дозволяється використовувати для пиття, технічних, господарсько-побутових та інших потреб.

Для **знезараження забрудненої води** (річкової, озерної, ставкової тощо) необхідну кількість засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) розчиняють у воді з розрахунку 5-15 мг активного хлору на 1 л води або виготовляють концентрований розчин засобу та додають його у воду. Необхідну кількість засобу визначають відповідно до об'єму води, що підлягає знезараженню, згідно з таблицею 10. При знезараженні природних каламутних та високоцвітних вод обов'язковим є попереднє фільтрування води через дрібний фільтр. Вміст залишкового вільного хлору у фільтрованій каламутній та цвітній воді повинен становити 1,4-1,6 мг/л через 30 хвилин після розчинення таблеток або введення концентрованого розчину. Для видалення надлишки хлору та можливих побічних хлорвмісних вуглеводнів після знезараження рекомендується фільтрація води через активоване вугілля або інші сорбенти. Таку воду після знезараження дозволяється використовувати для технічних та господарсько-побутових потреб (не питних).

Визначення необхідної дози хлору для знезараження води здійснюють методом пробного хлорування. Для цього беруть 3 ємності, наливують в кожну по 1 л води, розчиняють у них засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) із розрахунку 2, 4, 6 мг активного хлору для води, яка не потребує очищення, або 5, 10, 15 мг для фільтрованої каламутної та цвітної води. Розчини почергово ретельно перемішують, через 30 хвилин оцінюють запах хлору у воді. Ефективною вважається кількість засобу, при введенні якої через 30 хвилин відчувається слабкий запах хлору у воді. Якщо запах хлору дуже сильний, необхідно повторити пробне хлорування, зменшивши кількість засобу. Якщо, навпаки, запах хлору взагалі не відчувається, необхідно повторити пробне хлорування, збільшивши кількість засобу.

Знезараження води для приготування харчового льоду, зокрема, при приготуванні харчового льоду у великих (промислових) об'ємах з води із систем централізованого господарсько-питного водопостачання, здійснюють за умови відповідності води за санітарно-хімічними показниками ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Для знезараження води для приготування харчового льоду необхідну кількість засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) розчиняють у воді з розрахунку 2-6 мг активного хлору на 1 л води або виготовляють концентрований розчин засобу та додають його

у воду (виробничу систему). Необхідну кількість засобу визначають відповідно до об'єму води, що підлягає знезараженню, згідно з таблицею 10. Вміст залишкового вільного хлору у воді повинен становити 0,3-0,5 мг/л через 30 хвилин після розчинення таблеток або введення концентрованого розчину. Після знезараження воду заморожують.

Таблиця 10. Режими застосування засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для знезараження води при централізованому, автономному та нецентралізованому (місцевому) водопостачанні

Об'єкти знезараження	Концентрація активного хлору у воді		Кількість засобу, таблеток	Об'єм води, л	Експозиція, хв.	Вільний залишковий хлор, мг/л
	%	мг/л				
Вода, яка не потребує очищення (прозора і безбарвна колодязна, калтажна, артезіанська тощо); водопровідна вода (додаткове знезараження); вода для приготування харчового льоду	0,0002	2	1	750	30	0,3-0,5
	0,0004	4	1	375	30	
	0,0006	6	1	250	30	
Забруднена вода (річкова, озерна, ставкова тощо)	0,0005	5	1	300	30	1,4-1,6
	0,0010	10	1	150	30	
	0,0015	15	1	100	30	

4.2.24. Фрукти та овочі спочатку обмивають водою для видалення бруду, а потім дезінфікують методом занурення у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимом згідно з таблицею 11. Після закінчення дезінфекції фрукти та овочі промивають питною водою та обсушують.

4.2.25. Ємності для зберігання та транспортування води дезінфікують робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами згідно з таблицею 11 одним із методів:

- внутрішні поверхні ємностей протирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу, або зрошують робочим розчином з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо із розрахунку 100 мл розчину на 1 м² поверхні, що піддається обробці;
- заповнюють ємності робочим розчином засобу або водою, в якій розчиняють необхідну кількість засобу.

Після закінчення дезінфекції ємності для води обполісують питною водою.

4.2.26. Системи подачі води у стоматологічних установках, плавальних басейнах, водних атракціонах, гідромасажних ваннах, джакузі тощо дезінфікують методом заповнення робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимом згідно з таблицею 11.

Таблиця 11. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції фруктів, овочів, ємностей для води, систем подачі води

Об'єкти дезінфекції	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція, хв.	Методи дезінфекції
		таблеток	води, л		
Фрукти та овочі	0,004	1	37,5	30	Занурення
Ємності для зберігання та транспортування води	0,0025	1	60	45	Протирання або зрошення
				30	Заповнення
Системи подачі води у стоматологічних установках, плавальних басейнах, водних атракціонах, гідромасажних ваннах, джакузі тощо	0,0025	1	60	30	Заповнення

4.2.27. Дезінфекцію об'єктів у спортивно-оздоровчих закладах, басейнах, аквапарках, саунах, лазнях здійснюють робочими розчинами засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) з метою профілактики (у т.ч. при проведенні генеральних прибирань) за режимами згідно з таблицею 12. Зазначені режими забезпечують знищення:

- збудників бактеріальних (за винятком туберкульозу) та вірусних інфекцій на поверхнях приміщень, крім приміщень «чаші» басейну, водних атракціонів, парилень, переодягалень, душових, санузлів (спортивні зали, медичні кабінети, іdalінь, коридори, адміністративні, складські приміщення тощо), а також на предметах обстановки, поверхнях апаратів, приладів, устаткування, технічного обладнання у таких приміщеннях;

- збудників бактеріальних (за винятком туберкульозу), вірусних та грибкових інфекцій (кандидози, дерматомікози) на поверхнях приміщень «чаші» басейну, водних атракціонів, парилень, переодягалень, душових, санузлів, а також на предметах обстановки, поверхнях апаратів, приладів, устаткування, технічного обладнання у таких приміщеннях, поверхнях «чаші» басейнів, ванн для ніг, обладнання водних атракціонів, санітарно-технічного обладнання, взуття зі шкіри та інших матеріалів, банних сандалій, капців, гумових та поліпропіленових килимків, гумових рукавичок та іншого з гуми, пластмас, синтетичних матеріалів, спортивного інвентарю, прибирального інвентарю.

Поверхні приміщень (підлога, стіни, стеля, двері, підвіконня, віконні рами, ручки дверей, вікон тощо), **предмети обстановки** (шафи, ослони, інші тверді меблі, дерев'яні решітки, обхідні доріжки, трапи, спортивні тумби тощо), **поверхні апаратів, приладів, устаткування, технічного обладнання** протирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати робочого розчину складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці. Після закінчення дезінфекції паркетну підлогу, меблі з дерева, у тому числі поліровані, протирають сухим ганчір'ям для запобігання деформації дерев'яних поверхонь під дією вологи.

«Чаші» басейнів, ванні для ніг, обладнання водних атракціонів (після спуску води), **санітарно-технічне обладнання** (унітази, раковини, крани, душове обладнання, ванни, зокрема, ванни для бальнеологічних процедур, гідромасажні ванни, джакузі) протирають ганчір'ям або чистять щіткою (йоржем), змоченими у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. При необхідності (сильному забрудненні об'єктів) проводять дворазову обробку з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції. Норма витрати робочого розчину складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці, на одну обробку. Після закінчення дезінфекції об'єкти дезінфекції обполіскують водопровідною водою.

Взуття зі шкіри та інших матеріалів, банні сандалії, капці, гумові та поліпропіленові килимки, гумові рукавички та інше з гуми, пластмас, синтетичних матеріалів дезінфікують методами протирання, зрошення робочим розчином або занурення у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки). При зануренні вживають заходів для недопущення спливання об'єктів дезінфекції на поверхню, ємності із зануреними у розчин об'єктами щільно закривають кришками. Після закінчення дезінфекції об'єкти дезінфекції промивають проточною водою.

Спортивний інвентар дезінфікують методами протирання, зрошення робочим розчином або занурення у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки). При зануренні вживають заходів для недопущення спливання об'єктів дезінфекції на поверхню, ємності із зануреними у розчин об'єктами щільно закривають кришками. Після закінчення дезінфекції об'єкти дезінфекції промивають проточною водою.

Прибиральний інвентар (гагчір'я, швабри, щітки, йоржі, відра, совки тощо) занурюють у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), протирають або зрошують робочим розчином засобу. Ємності із зануреними у розчин об'єктами щільно закривають кришками. Після закінчення дезінфекції гагчір'я прополіскують і висушують, інші об'єкти дезінфекції промивають проточною водою.

Таблиця 12. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів у спортивно-оздоровчих закладах, басейнах, аквапарках, саунах, лазнях

Об'єкти дезінфекції	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція, хв.	Методи дезінфекції ¹⁾
		таблеток	води, л		
Поверхні приміщені, крім приміщень «чаші» басейну, водних атракціонів, парилень, переодягалень, душових, санузлів (спортивні залі, медичні кабінети, ідаліні, коридори, адміністративні, складські приміщення тощо), а також предмети обстановки, поверхні апаратів, пристрій, устаткування, технічного обладнання у таких приміщеннях	0,01 0,015 0,03 0,06 0,1	1	15	90	Протирання або зрошення
		1	10	60	
		2	10	30	
		4	10	15	
		7	10	10	
Поверхні приміщень «чаші» басейну, водних атракціонів, парилень, переодягалень, душових, санузлів, а також предмети обстановки, поверхні апаратів, пристрій, устаткування, технічного обладнання у таких приміщеннях	0,03 0,06	2	10	60	Протирання або зрошення
		4	10	30	
«Чаші» басейнів, ванни для ніг, обладнання водних атракціонів, санітарно-технічне обладнання	0,06 0,1	4	10	60	Протирання, або зрошення, або чищення ²⁾
		7	10	30	
Взуття зі шкіри та інших матеріалів, банні сандалії, кепці, гумові та поліпропіленові килимки, гумові рукавички та інше з гуми, пластмас, синтетичних матеріалів	0,1	7	10	60	Протирання, або зрошення, або занурення
Спортивний інвентар	0,03 0,06 0,1	2 4 7	10 10 10	60 30 15	Протирання, або зрошення, або занурення
Прибиральний інвентар	0,1	7	10	60	Занурення, або протирання, або зрошення

Примітки:

¹⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу;

²⁾ при необхідності (сильному забрудненні об'єктів) проводять дворазову обробку з інтервалом 15 хвилин і наступним дотриманням експозиції.

4.2.28. Знезараження води в плавальніх басейнах, водних атракціонах, гідромасажних ваннах, джакузі здійснюють із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) методами розчинення необхідної кількості засобу у воді або додавання у воду концентрованого розчину засобу (для виготовлення концентрованого розчину необхідну кількість засобу розчиняють у невеликій кількості води в окремій ємності). Другий метод є переважним при можливості введення концентрованого розчину в систему подачі води (за допомогою дозатора або вручну), оскільки таким чином досягається рівномірне розподілення засобу у воді та кращий ефект знезараження. Необхідну кількість засобу визначають відповідно до об'єму води, що підлягає знезараженню.

Висока знезаражуюча активність засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) досягається при вмісті активного хлору у воді 0,6 мг/л протягом 5-ти хвилин. Робочі дози засобу визначають випробувальним методом із розрахунку початкового вмісту активного хлору у воді 0,6-0,7 мг/л, залежно від навантаження на плавальний басейн, водні атракціони або ванни, якості води, здатності води поглинати хлор тощо.

При запуску басейну або водних атракціонів воду в них знезаражують за 30-60 хвилин до початку роботи басейну або водних атракціонів за режимом згідно з таблицею 13. Під час експлуатації басейну або водних атракціонів можливе додаткове знезараження води в них для доведення вмісту активного хлору у воді до норми (формули 1-2).

Воду в рециркуляційних системах гідромасажних ванн, джакузі при необхідності знезаражують за 30-60 хвилин до проведення водних процедур за режимом згідно з таблицею 13.

Таблиця 13. Режими застосування засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для знезараження води в плавальних басейнах, водних атракціонах, гідромасажних ваннах, джакузі

Об'єм води в басейні, водному атракціоні, рециркуляційній системі гідромасажної ванні, джакузі, м ³	Концентрація активного хлору у воді, мг/л (г/м ³)	Кількість активного хлору, що вводиться, г	Кількість засобу, що вводиться, таблеток	Експозиція, хв.	Вільний залишковий хлор ¹⁾ , мг/л
2,5	0,6	1,50	1	30	0,3-0,5
	0,7	1,75	2		
10	0,6	6	4	30	0,3-0,5
	0,7	7	5		
20	0,6	12	8	30	0,3-0,5
	0,7	14	10		
50	0,6	30	20	30	0,3-0,5
	0,7	35	24		
100	0,6	60	40	30	0,3-0,5
	0,7	70	47		
150	0,6	90	60	30	0,3-0,5
	0,7	105	70		
300	0,6	180	120	30	0,3-0,5
	0,7	210	140		

¹⁾ для дітей віком до 7 років допускається вміст залишкового вільного хлору у воді 0,1-0,3 мг/л.

Загальні умови знезараження води в плавальних басейнах: знезараження води, яка подається у «чаші» басейнів, є обов'язковим і проводиться відповідно до чинних в Україні нормативних документів. Дотримання режимів і рекомендацій, наведених у цих Методичних вказівках, а також вимог, встановлених відповідними нормативними документами, забезпечує бактерицидний ефект води в об'ємах басейну та безпечні умови для персоналу, відвідувачів.

Водообмін у басейнах повинен забезпечуватися проточними або рециркуляційними системами. Для підтримання постійної концентрації та рівномірного розподілення засобу по всьому об'єму басейну системи повинні бути обладнані вимірювальною апаратурою.

Методика знезараження води в плавальних басейнах: для знезараження води в басейні необхідну кількість засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) розчиняють у невеликій кількості води в спеціально виділеній промаркованій ємності (концентрований розчин), а потім цей розчин додають у воду в басейні: при проточній системі – до трубопроводу, що подає воду: при рециркуляційній системі – перед фільтрами.

Під час експлуатації басейну необхідно проводити контроль якості води в ньому на вміст залишкового вільного хлору перед початком роботи басейну та далі через кожні 4 години. Якщо вміст залишкового вільного хлору у воді опустився нижче 0,3 мг/л, здійснюють «піддживлення» води засобом – доведення концентрації активного хлору до норми (формули 1-2).

$$M = \frac{V \cdot (K_1 - K_2)}{C} \cdot 100\%, \text{де} \quad (1)$$

M – кількість засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), необхідна для доведення концентрації активного хлору у воді в басейні до норми, г;

V – об'єм води в басейні, m^3 ;

K_1 – необхідна концентрація активного хлору у воді в басейні, мг/л (g/m^3);

K_2 – фактична концентрація активного хлору у воді в басейні, мг/л (g/m^3);

C – середній вміст активного хлору в засобі, 45%.

$$N = M/M_T, \text{де} \quad (2)$$

N – кількість засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), необхідна для доведення концентрації активного хлору у воді в басейні до норми, таблеток;

M_T – середня маса таблетки, 3,45 г.

Вимоги до повіtroобміну в приміщеннях басейнів: приміщення плавальних басейнів повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції та кондиціонування, які повинні забезпечувати повіtroобмін у приміщенні басейну $80 m^3/\text{год}$. на одного відвідувана та безпечний вміст вільного хлору у повітрі (у т.ч. над дзеркалом води в басейні) не вище $0,1 mg/m^3$. У літній період рекомендується додатково провітрювати приміщення басейну через відкриті вікна. Ефективність роботи систем припливно-витяжної вентиляції та кондиціонування підлягає контролю не рідше 1-го разу на рік.

Вимоги до водообміну в басейнах: для басейнів у дошкільних, навчальних та оздоровчих закладах (малі басейни з площею дзеркала води до $100 m^3$) строк повної заміни води повинен становити: у басейнах для дітей – не більше 8 годин; у басейнах для дорослих – не більше 12 годин. У випадку, якщо неможливо забезпечити безперервну подачу водопровідної води до басейну, щодобово проводять її повну заміну.

Вимоги до якості води в басейнах: якість води, що подається у «чаші» плавальних басейнів, повинна відповідати вимогам до води питного призначення, встановленим відповідними нормативними документами.

У разі застосування засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) в кількості відповідно до точки перелому при активній реакції води (рН) в межах 7,2-7,8 відбувається максимальний ефект зневажлення з мінімальною подразнюючою дією для людини. Значення рН води не повинно перевищувати 7,8. Вміст залишкового вільного хлору у воді повинен становити $0,3-0,5 mg/l$ через 30 хвилин після введення засобу. Для дітей віком до 7 років допускається вміст залишкового вільного хлору у воді $0,1-0,3 mg/l$. Вміст хлоридів у воді не повинен підвищуватися більше, ніж на $200 mg/l$, порівняно з чистою водою, що надходить до басейну. Перманганатна окислюваність води (показник вмісту органічних речовин) повинна бути не більше $5 mg/l$. Необхідно забезпечити відсутність у воді аміаку, солей азоту, токсичних речовин.

Умови та методика знезараження води у водних атракціонах, вимоги до повіtroобміну в приміщеннях, водообміну в системах, якості води тощо аналогічні викладеним вище для басейнів.

4.2.29. Дезінфекція та санітарна обробка технологічного обладнання, посуду, виробничої та зворотної тарі, інвентарю, поверхонь виробничих приміщень, внутрішньоцехового транспорту на підприємствах харчопереробної промисловості (м'ясної, консервної, птахопереробної, яичної, рибної, молочної, масложирової, піддоовочевої, сирної, кондитерської, хлібопекарської промисловості, підприємствах з виготовлення продуктів дитячого харчування, напоїв, вирощування грибів тощо) проводиться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) відповідно до рекомендацій, наведених нижче, за режимами згідно з таблицями 14-20. При систематичному застосуванні засобу, з урахуванням специфіки підприємства та результатів мікробіологічного контролю, можливе коригування концентрацій робочих розчинів та експозицій, наведених у цих Методичних вказівках.

Дезінфекція та санітарна обробка (далі – «дезінфекція») торговельного обладнання (ваги, транспортери, прилавки, вітрини, холодильні камери тощо), поверхонь приміщень (складських, господарсько- побутових тощо), транспорту для перевезення харчової сировини та готової продукції (у т.ч. рефрижераторного), санітарно-технічного обладнання, санітарного одягу, спедодиягу, взуття, прибирального інвентарю тощо проводяться із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) згідно з пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.16, таблицею 2.

Підготовка до дезінфекції: дезінфекцію технологічного обладнання та поверхонь виробничих приміщень на підприємствах харчопереробної промисловості проводять після попереднього миття та промивання (обполіскування) водою об'єктів обробки.

Об'єкти, які безпосередньо контактирують з харчовою сировиною (обладнання, ємності, трубопроводи, обробні столи, дошки, стелажі, транспортери тощо), механічно очищають або промивають водою для видалення харчових залишків, знежириють лужними миючими розчинами, промивають або обполісують водою для видалення залишків миючого розчину.

При необхідності проводять додаткове миття (знежирення) лужними або кислотними муючими засобами для видалення білково-жирових відкладень і забруднень неорганічного характеру з наступним промиванням (обполіскуванням) водою.

Ретельність проведення цих операцій в значній мірі визначає ефективність дезінфекції. Неприпустима наявність білково-жирових забруднень на поверхнях, які піддаються дезінфекції.

Після повного видалення залишків муючого розчину технологічне обладнання, поверхні виробничих приміщень дезінфікують із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки).

Способи застосування засобу: дезінфекцію із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) здійснюють механізованим або ручним способом. Необхідну кількість засобу або концентрований розчин засобу вносять, залежно від способу дезінфекції:

- до баку мийної станції (балансувальний бак тощо) при механізованому способі;
- до мийної ванни або витратної ємності для робочого розчину при ручному способі.

Для виготовлення концентрованого розчину необхідну кількість засобу розчиняють у невеликій кількості води в спеціально виділений промаркований ємності.

Повторне застосування робочих розчинів засобу: дозволяється повторне (3-4 рази) застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за відсутності білково-жирового забруднення, але не довше строку придатності розчину. Для цього після кожного застосування розчину визначають вміст активного хлору в ньому, при необхідності доводять концентрацію активного хлору до норми (формули 3-4). За наявності у застосованому розчині механічних домішок або органічних речовин такий розчин зливують у каналізацію.

Механізований спосіб дезінфекції: передбачає рециркуляцію робочого розчину засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) в системі (СП), промивання об'єктів розчином за допомогою мийних машин карусельного чи тунельного типу або заповнення об'єктів розчином (при можливості – з циркуляцією розчину в увімкненій машині).

Рекомендовані концентрації робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) визначені з урахуванням того, що при механізованому (СП) способі можливе зниження вмісту активного хлору в розчині через розбавлення його водою, яка залишилася в системі. Після початку рециркуляції розчину в системі здійснюють контроль розчину на вміст активного хлору. Якщо відбулося суттєве зниження вмісту активного хлору, здійснюють «підживлення» розчину засобом – доведення концентрації активного хлору до норми (формули 3-4).

$$M = \frac{V \cdot (K_1 - K_2)}{C} \cdot 1000, \text{де} \quad (3)$$

M – кількість засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), необхідна для доведення концентрації активного хлору у застосованому робочому розчині до норми, г;

V – кількість застосованого робочого розчину, л;

K₁ – необхідна концентрація робочого розчину за активним хлором, %;

K₂ – фактична концентрація застосованого розчину за активним хлором, %;

C – середній вміст активного хлору в засобі, 45%.

$$N = M/M_T, \text{де}$$

(4)

N – кількість засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), необхідна для доведення концентрації активного хлору у застосованому робочому розчині до норми, таблеток;

M_T – середня маса таблетки, 3,45 г.

Ручний спосіб дезінфекції: передбачає застосування засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) у вигляді робочих розчинів методами протирання, чищення, зрошення розчином засобу, занурення у розчин, замочування у розчині, заповнення розчином тощо.

Для дезінфекції великовагабаритного обладнання на поверхню обладнання багаторазово (не менше 10 разів на хвилину) наносять робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) методом протирання ганчір'ям або чищення щіткою (йоржем), змоченими у робочому розчині, або методом зрошення робочим розчином з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Під час обробки необхідно забезпечувати рівномірне змоочування поверхні та постійну наявність на ній робочого розчину. При обробці важкодоступних ділянок триває обробки збільшують. Норма витрати робочого розчину складає 100-250 мл/м² поверхні, що піддається обробці.

Для дезінфекції деталей обладнання, посуду, тари, інвентарю методом занурення повинні бути передбачені стаціонарні та/або пересувні 2-3-секційні мийні ванни, столи для запчастин, стелажі для сушіння деталей, посуду, тари, інвентарю. Об'єкти дезінфекції, занурені у робочий розчин засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), багаторазово обробляють за допомогою щітки або йоржа.

Для дезінфекції поверхонь виробничих приміщень, внутрішньоцехового транспорту іх протирають ганчір'ям, змоченим у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати робочого розчину складає 100 мл/м² поверхні, що піддається обробці.

Дезінфекція технологічних трубопроводів: нерозбірні трубопроводи промивають водою для видалення харчових залишків, вставляють заглушки, заповнюють лужним миючим розчином та залишають на 2-4 години. Потім промивають водою для видалення залишків миючого розчину та дезінфікують робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) механізованим способом. Після закінчення дезінфекції промивають водою для видалення залишків робочого розчину.

Розбірні трубопроводи відмивають водою від харчових залишків та промивають лужним муючим розчином. Потім промивають водою для видалення залишків муючого розчину та дезінфікують робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) ручним способом. Після закінчення дезінфекції промивають струменем води або в проточній воді для видалення залишків робочого розчину.

Дезінфекція технологічних резервуарів та ємностей: після видалення харчових залишків, промивання лужним муючим розчином і видалення залишків муючого розчину внутрішні поверхні технологічних резервуарів та ємностей дезінфікують із застосуванням засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) одним з наступних методів:

- заповнюють резервуари, ємності робочим розчином засобу;
- наносять робочий розчин засобу на внутрішні поверхні за допомогою голівки муючого пристрою;
- протирають ганчір'ям або чистять щіткою (йоржем), змоченими у робочому розчині засобу, або зрошують робочим розчином з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати робочого розчину складає 100-250 мл/м² поверхні, що піддається обробці.

Після закінчення дезінфекції внутрішні поверхні технологічних резервуарів та ємностей обполіскують водою для видалення залишків робочого розчину.

Зовнішні поверхні технологічних резервуарів та ємностей протирають ганчір'ям або чистять щіткою (йоржем), змоченими у робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), або зрошують робочим розчином з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо. Норма витрати робочого розчину складає 100-250 мл/м² поверхні, що піддається обробці.

Дезінфекція арматури, що не використовується: арматуру (клапани, шланги тощо) зберігають у резервуарі з нержавіючої сталі в робочому розчині засобу «Жавель-Клейд» (таблетки). Розчин замінюють щоденno. Перед використанням арматуру промивають водою.

Контроль на повноту відмивання: об'єкти, які безпосередньо контактують з харчовою сировиною, одразу після дезінфекції промивають водою до повного видалення залишків робочого розчину протягом 3-15 хвилин (не менше 10 хвилин у м'ясній, птахопереробні і рибній промисловості; не менше 15 хвилин у кондитерській і хлібопекарській промисловості). У виробництві напоїв, одержані непастеризованих напоїв з біологічною стійкістю при зберіганні більше 30 діб і при дезінфекції обладнання, комунікацій, емностей на стадіях після зневідновлювального фільтрування та пастеризації в потоці рекомендується проводити змивання залишків робочого розчину запливдненою водою.

Контроль на повноту відмивання здійснюють наступним чином: воду для промивання (контрольна проба) та розчин після відмивання (змивна вода) об'ємом по 200 см^3 поміщають у колби на $250-500 \text{ см}^3$, додають до кожної по 20 см^3 10%-го розчину сірчаної кислоти, 10 см^3 10%-го розчину йодистого калію та 1 см^3 0,5%-го розчину крохмалю. Більш інтенсивне забарвлення змивної води порівняно з контрольною пробою свідчить про необхідність продовження відмивання протягом 1-2 хвилин. Однакове забарвлення води в обох колбах вказує на відсутність у змивній воді залишків засобу.

Таблиця 14. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів на підприємствах м'ясної промисловості, підприємствах з виготовлення м'ясних консервів, продуктів дитячого харчування

Об'єкти дезінфекції	Концентрація ¹⁾ роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експо- зиція ²⁾ , хв.	Методи дезінфекції ³⁾
		таблеток	води, л		
Обладнання (вовчки, кутери, масажери, м'ясорубки, котельні, пельменні, шприцевальні апарати, фаршишалки тощо), обробні столи, трубопроводи	0,03	2	10	15	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення Ручний: протирання, чищення або зрошення
Обробні дошки, стелажі, транспортери	0,045	3	10	15	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Тара, крупний інвентар (лотки, противні, ковші, бочки, напільні візки тощо)	0,03	2	10	15	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Дрібний інвентар, посуд (у т.ч. обробні ножі)	0,03	2	10	15	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення
Знімні частини обладнання (вовчки, кутери, шприци тощо), арматура, дрібний інвентар	0,03	2	10	15	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення
Поверхні виробничих приміщень	0,045	3	10	15	Ручний: протирання, чищення або зрошення

Примітки:

¹⁾ температура робочих розчинів повинна становити 20°C ;

²⁾ при температурі поверхні, що обробляється, $4-10^\circ\text{C}$ експозиція збільшується вдвічі;

³⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу.

Таблиця 15. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів на підприємствах птахопереробної та яєчної промисловості

Об'єкти дезінфекції	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція, хв.	Методи дезінфекції ¹⁾		
		таблеток	води, л				
1	2	3	4	5	6		
Цехи первинної переробки птиці:							
Обробні столи, стрічкові транспортери, конвеєри, автомати для потрошеннЯ, установки для виділення безкісткового м'яса	0,015	1	10	20	Ручний: протирання, чищення або зрошення		
Трубопроводи нерозбірні	0,015-0,03 ²⁾	1-2	10	20	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП) або заповнення		
Трубопроводи розбірні	0,015-0,03 ²⁾	1-2	10	20	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення		
Робочі органи пір'язнімних машин, диски, білли, поверхні пластин, електропили	0,015-0,03 ²⁾	1-2	10	20	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення		
Ванни, жолоби збору крові, ванни електроГлушіння, ванни теплової обробки, ванни охолодження, холодильні камери	0,015-0,03 ²⁾	1-2	10	20	Ручний: заповнення, протирання, чищення або зрошення		
Ножі, ножиці, вилки та інші інструменти	0,015	1	10	20	Ручний: занурення		
Цехові транспортні засоби, візки, піддони, металеві та пластмасові ящики	0,03	2	10	20	Ручний: протирання, чищення або зрошення		
Автомашини, тракторні візки, контейнери	0,03	2	10	20	Ручний: протирання, чищення або зрошення		
Санітарна бійня:							
Ванни шпарки, охолодження, транспортери, жолоби, обробні столи, центрифуги	0,03	2	10	20	Ручний: заповнення, протирання, чищення або зрошення		
Візки, ящики, піддони, дрібний інвентар, дрібні інструменти	0,03	2	10	20	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення		
Цехи з виробництва ковбасних і кулінарних виробів, напівфабрикатів, консервів, яйцепродуктів:							
Кутери, мішалки, кутер-мішалки, ін'ектори, масажери, накопичувальні смісості, пастеризаційно-охолоджувальні установки	0,015	1	10	20	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення		
Дрібний інвентар, посуд, м'ясорубки, вовчки, кутери	0,015	1	10	20	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення		

Закінчення таблиці 15

1	2	3	4	5	6
Машини для розділення тушок та виділення безкісткового м'яса, машини для сортування, миття та дезінфекції яєць, машини для розділення яєць та відділення білка від жовтку, пакувальні, пельменні, котлетні автомати, сушарні для яйцепродуктів, термокамери, котли, шприцювальні апарати	0,015	1	10	20	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення
Візки, лотки, ящики (металеві, дерев'яні, пластикові тощо)	0,015-0,03 ²⁾	1-2	10	20	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Поверхні виробничих приміщень:					
Підлога (щозмінні), стіни, кахель, двері тощо (щодня)	0,015	1	10	20	Ручний: протирання, чищення або зрошення

Примітки:

¹⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу;²⁾ концентрація розчинів залежить від ступеню забрудненості об'єктів дезінфекції.

Таблиця 16. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів на підприємствах рибної промисловості

Об'єкти дезінфекції (обладнання та деталі залежно від технологічного процесу)	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція, хв.	Методи дезінфекції ¹⁾
		таблеток	води, л		
Вилов та приймання риби, морепродуктів (трубопроводи, резервуари морської води, бункери приймання, ємності, конвеєри, обладнання для миття і сортування сировини)	0,003	1	50	60-360	Ручний: заповнення, занурення, протирання, чищення або зрошення
Охолодження, заморожування, глазурування, розмороження, соління, в'ялення, консервація	0,015-0,03 ²⁾	1-2	10	30	Ручний: заповнення, занурення, протирання, чищення або зрошення
Оброблення, подрібнення, жироборошнинне виробництво: деталі обладнання, тара (бочки, яшки, лотки, візки)	0,015-0,03 ²⁾	1-2	10	30	Ручний: заповнення, занурення, протирання, чищення або зрошення
Транспортери, внутрішньо-заводський транспорт	0,015-0,03 ²⁾	1-2	10	30	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Поверхні виробничих приміщень	0,015	1	10	30	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Знезараження морської води, відібраний для тузлуку та інших потреб	0,0005-0,0015 ²⁾	1	300-100	30	Додавання засобу або концентрованого розчину засобу у воду

Примітки:

¹⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу, за винятком знезараження води для тузлуку та інших потреб;²⁾ концентрація розчинів залежить від ступеню забрудненості об'єктів дезінфекції.

Таблиця 17. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів на підприємствах молочної, масложирової, плодоовочевої (у т.ч. консервої) промисловості, цехах з виготовлення морозива, майонезу, йогуртів, соусів тощо

Об'єкти дезінфекції	Концентрація ¹⁾ роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція ²⁾ , хв.	Методи дезінфекції ³⁾
		таблеток	води, л		
Резервуари, цистерни (у т.ч. молочні), ємності (танки), поверхні обладнання, трубопроводи для молока, молочних продуктів, молочних компонентів, суміші плодоовочевих, морозива, майонезу, йогуртів, соусів тощо, лічильники, насоси, теплообмінне обладнання: охолоджувачі, фрізери, пастиратори, стерилізатори (у т.ч. ємнісні)	0,01-0,015 ⁴⁾	1	15-10	не менше 10	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення
	0,01	1	15	10	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Ємності: заквасочники, пастиризаційні баки, ванни для суміші молока, морозива тощо, ванни тривалої пастиризації (ВТП), лінії розливу, розливочні та пакувальні машини, фасувальні автомати рідких і пастоподібних продуктів (у т.ч. молочних)	0,01-0,015 ⁴⁾	1	15-10	не менше 10	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення
	0,01	1	15	10	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Деталі обладнання, машин і установок (тарілки сепараторів, заглушка, крані, муфти тощо), дрібний інвентар, арматура, транспортні стрічки	0,01	1	15	10	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення
Тара (фляги, бідони, металеві та поліетиленові корзини, яшки тощо)	0,01-0,015 ⁴⁾	1	15-10	не менше 10	Механізований: промивання за допомогою мийних машин
	0,01	1	15	10	Ручний: заповнення, занурення, протирання, чищення або зрошення
Поверхні виробничих приміщень	0,015	1	10	не менше 10	Ручний: протирання, чищення або зрошення

Примітки:

¹⁾ при механізованому способі дезінфекції температура робочих розчинів повинна бути 20-45 °C, при ручному способі дезінфекції температура робочих розчинів повинна бути 20-40 °C;

²⁾ при механізованому способі дезінфекції експозиція залежить від довжини трубопроводу, розмірів об'єкта дезінфекції та його віддаленості від мийної станції;

³⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу;

⁴⁾ концентрація розчинів залежить від ступеню забрудненості об'єктів дезінфекції.

Таблиця 18. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів на підприємствах сирної промисловості

Об'єкти дезінфекції	Концентрація ¹⁾ роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція ²⁾ , хв.	Методи дезінфекції ³⁾
		таблеток	води, л		
Столи, преси, полиці, стелажі	0,015	1	10	10	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Сирні ванні, пастеризаційні баки, формувальні апарати, віддільники сироватки, інші виробничі ємності	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення
	0,015	1	10	10	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Пластинчасті пастеризатори, насоси, комунікації, трубопроводи, теплообмінне обладнання (охолоджувачі, фризери тощо)	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення
	0,015	1	10	10	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Сирні форми, солильні басейни	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: промивання за допомогою мийних машин
	0,015	1	10	10	Ручний: заповнення, протирання, чищення або зрошення
Деталі обладнання, машин, апаратів і установок, арматура, дрібний інвентар	0,015	1	10	10	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення
Тара (фляги, бідони, металеві та поліетиленові корзини, ящики тощо)	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: промивання за допомогою мийних машин
	0,015	1	10	10	Ручний: заповнення, занурення, протирання, чищення або зрошення
Поверхні виробничих приміщень	0,015	1	10	не менше 10	Ручний: протирання, чищення або зрошення

Примітки:

¹⁾ при механізованому способі дезінфекції температура робочих розчинів повинна бути 20-45 °C, при ручному способі дезінфекції температура робочих розчинів повинна бути 20-40 °C;

²⁾ при механізованому способі дезінфекції експозиція залежить від довжини трубопроводу, розмірів об'єкта дезінфекції та його віддаленості від мийної станції;

³⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу.

Таблиця 19. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів на підприємствах кондитерської та хлібопекарської промисловості

Об'єкти дезінфекції	Концентрація ¹⁾ роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція ²⁾ , хв.	Методи дезінфекції ³⁾
		таблеток	води, л		
Обладнання та апаратура для молока, крему, варильні котли для сиропу, баки для зберігання сиропу, чани, мірні бачки, транспортери, мішалки, змішувачі тощо, обладнання, тара, інвентар для приготування яєчної маси, трубопроводи (у т.ч. систем подачі цукрово-сольового розчину, молочно-цукрового сиропу, яйцепродуктів)	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення
	0,015	1	10	10	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Машини збивання крему	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення
Столи для оздоблення тортів і тістечок	0,015	1	10	10	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Знімні деталі обладнання, апаратури, роз'ємні вузли, посуд, тара, інвентар	0,015	1	10	10	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення
Тара (фляги, бідони, металеві та поліетиленові корзини, ящики тощо)	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: промивання за допомогою мийних машин
	0,015	1	10	10	Ручний: заповнення, занурення, протирання, чищення або зрошення
Вироби з тканини (касети, платки тощо)	0,015	1	10	не менше 10	Ручний: замочування ⁴⁾
Поверхні виробничих приміщень	0,015	1	10	не менше 10	Ручний: протирання, чищення або зрошення

Примітки:

¹⁾ при механізованому способі дезінфекції температура робочих розчинів повинна бути 20-45 °C, при ручному способі дезінфекції температура робочих розчинів повинна бути 20-40 °C;

²⁾ при механізованому способі дезінфекції експозиція залежить від довжини трубопроводу, розмірів об'єкта дезінфекції та його віддаленості від мийної станції;

³⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу;

⁴⁾ також можливе додавання у пральну машину в другеолоскання концентрованого розчину засобу в температурному режимі не вище 30 °C, при експозиції не менше 10 хвилин; після закінчення дезінфекції вироби з тканин перуть, полощуть і висушують.

Таблиця 20. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції об'єктів на підприємствах з виробництва напоїв (алкогольних, безалкогольних)

Об'єкти дезінфекції	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція ¹⁾ , хв.	Методи дезінфекції ²⁾
		таблеток	води, л		
Технологічні резервуари (бродильні резервуари, танки добривування, цистіндо-конічні танки, збірники, купажні резервуари тощо), трубопроводи, комунікації	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення
	0,015	1	10	10	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Теплообмінники, фільтри, сепаратори, пастиратори, фасувальне обладнання, розливочні та закупорювальні автомати, наповнювальні трубки тощо	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: рециркуляція розчину в системі (СП), промивання за допомогою мийних машин або заповнення
	0,015	1	10	10	Ручний: протирання, чищення або зрошення
Деталі обладнання, машин, апаратів і установок, арматура, дрібний інвентар	0,015	1	10	10	Ручний: занурення, протирання, чищення або зрошення
Тара (пляшки, бутлі, фляги, бідони тощо)	0,015	1	10	не менше 10	Механізований: промивання за допомогою мийних машин
	0,015	1	10	10	Ручний: заповнення, занурення, протирання, чищення або зрошення
Поверхні виробничих приміщень	0,015	1	10	не менше 10	Ручний: протирання, чищення або зрошення

Примітки:

¹⁾ при механізованому способі дезінфекції експозиція залежить від довжини трубопроводу, розмірів об'єкта дезінфекції та його віддаленості від мийної станції;

²⁾ дезінфекцію можна проводити з додаванням 0,5% миючого засобу.

4.2.30. Дезінфекцію поверхонь шкаралупи товарних (харчових) яєць доцільно проводити не більше, ніж за одну годину до використання яєць в їжу або в технологічному процесі приготування харчових продуктів.

Поверхні шкаралупи товарних (харчових) яєць дезінфікують робочими розчинами засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) за режимами згідно з таблицею 21 одним із методів:

- занурення яєць у робочий розчин засобу (розчин виготовляють у кількості, достатній для повного занурення яєць);
- зрошення робочим розчином з гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» тощо (розчин виготовляють у кількості, достатній для ретельного зволоження яєць з усіх боків);
- аерозольна обробка робочим розчином засобу за допомогою термооприскувача (туманогенератора), моторозпилювача або ранцевого (ручного) оприскувача, зокрема, розпилювача типу «Туман» (розчин виготовляють із розрахунку 2 л на 1000 шт. яєць).

Встановлена активна дія на бактерії (не спороутворюючі та спороутворюючі) робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), що дозволяє багаторазове їх використання. За відсутності механічного забруднення робочі розчини засобу можна використовувати для дезінфекції яєць методом занурення від 6 до 10 разів протягом доби.

При зрошенні та аерозольній обробці яєць в стелажі лотки з яйцями рекомендується розташовувати в стелажі через один ряд для кращого зволоження яєць з нижнього боку.

Таблиця 21. Режими застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) для дезінфекції поверхонь шкаралупи товарних (харчових) яєць

Об'єкти дезінфекції	Концентрація роб. розчину (за активним хлором), %	Кількість для приготування роб. розчину		Експозиція (не менше), хв.	Методи дезінфекції
		таблеток	води, л		
Поверхні шкаралупи товарних (харчових) яєць	0,015	1	10	2	Занурення
	0,015	1	10	5	Зрошення
	0,03	2	10	2	
	0,015	1	10	5	Аерозольна обробка
	0,03	2	10	2	

Після дезінфекції товарні (харчові) яйця необхідно промити в чистій водопровідній воді кімнатної температури для видалення залишків робочого розчину з поверхонь шкаралупи яєць.

Тара, в якій були не дезінфіковані товарні (харчові) яйця, у жодному разі не повинна використовуватися для дезінфікованих яєць.

Додаткові рекомендації щодо обробки робочих поверхонь та рук персоналу: разом з дезінфекцією товарних (харчових) яєць рекомендується проводити обробку робочих поверхонь робочим розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації 0,015% за активним хлором (1 таблетка на 10 л води).

Працівники харчоблоків, які контактували з не дезінфікованими товарними (харчовими) яйцями, повинні обробити руки розчином засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації 0,015% за активним хлором у разі подальшого контакту з дезінфікованими яйцями.

5. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

5.1. Загальні застереження при роботі із засобом: до роботи з дезінфекційним засобом «Жавель-Клейд» (таблетки) не допускають осіб молодше 18 років, вагітних жінок та жінок, які годують немовлят, осіб з підвищеною чутливістю до хлору (хлорвмісних сполук), алергічними захворюваннями, хронічними захворюваннями легень і верхніх дихальних шляхів.

Під час роботи із засобом забороняється вживати їжу, пити, курити. При проведенні робіт з дезінфекції слід уникати розбрязкування розчинів і попадання засобу в очі, на шкіру. Після закінчення роботи обличчя та руки необхідно вимити водою з мильом.

Після проведення робіт з дезінфекції приміщення, де вони проводилися, необхідно провітрювати протягом 15 хвилин. При кратності повітробіміну в приміщенні від 10 та вище провітрювання можна не проводити.

5.2. Засоби індивідуального захисту при приготуванні та застосуванні розчинів: роботи з приготування та застосування робочих розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації до 0,1% (за активним хлором) включно слід проводити у захисному одязі з використанням засобів захисту шкіри.

Роботи з приготування та застосування розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації вище 0,1% (за активним хлором), а також всі роботи із застосуванням робочих розчинів засобу методом зрошення та аерозольним методом слід проводити з використанням засобів захисту шкіри, органів дихання та очей – у захисному одязі (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини, гумові рукавички, спеціальне взуття), у респіраторі типу «Пелюстка», РПР-67 або РУ-60М з патроном марки В, у захисних окулярах типу ПО-2, ПО-3 чи моноблок.

5.3. Особливості застосування розчинів засобу для дезінфекції окремих об'єктів: при застосуванні розчинів засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації до 0,1% (за активним хлором) включно, крім застосування методом зрошення та аерозольним методом, активний хлор у повітрі приміщені в зоні дихання людини не перевищує ГДК для атмосферного повітря населених місць.

Допускається проведення дезінфекції (у т.ч. профілактичної) об'єктів, перелічених у п. 4.1 цих Методичних вказівок, у закладах, установах, на підприємствах тощо, перелічених у пп. 2.2, 2.3 цих Методичних вказівок, робочими розчинами засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації до 0,1% (за активним хлором) включно методами протирання розчином, занурення та замочування у розчині в ємностях зі щільно закритими кришками у присутності осіб, які не мають безпосереднього відношення до проведення дезінфекції (хворих, пацієнтів, відвідувачів, пасажирів, персоналу тощо) без використання ними засобів індивідуального захисту. Завантаження та вивантаження занурених (замочених) у розчині об'єктів здійснюють у призначених для цього добре провітрюваних приміщеннях за відсутності сторонніх осіб.

Дезінфекцію об'єктів розчинами засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) концентрації вище 0,1% (за активним хлором), а також дезінфекцію об'єктів методом зрошення та аерозольним методом здійснюють за відсутності сторонніх осіб.

Дезінфекцію іграшок здійснюють за відсутності дітей.

Дезінфекцію (у т.ч. профілактичну) у дитячих закладах доцільно здійснювати методом протирання за відсутності дітей під час проведення дезінфекції з обов'язковим наступним вологим прибиранням і провітрюванням приміщення протягом 15-30 хвилин.

5.4. Методи утилізації засобу та розчинів: засіб з вичерпанем терміном придатності або некондиційний внаслідок порушення умов збергання передається на договірних умовах спеціалізованим організаціям або постачальнику для переробки чи утилізації.

Відпрацьовані або невикористані протягом строку придатності робочі розчини засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) зливають у каналізацію (без попередньої нейтралізації та без розділення водою).

У випадку розливання розчини засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) змивають великою кількістю води. При випадковому розливанні розчинів засобу або розсипанні засобу роботи з їх прибиранням необхідно виконувати з дотриманням правил особистої безпеки та застосуванням засобів індивідуального захисту.

6. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ

6.1. Ознаки гострого отруєння: за умови недотримання застережних заходів при роботі із засобом можлива поява ознак подразнення слизових оболонок очей (різь, слізозотеча) та органів дихання (дере у горлі, кашель, часте дихання, виділення з носа), може виникнути головний біль.

6.2. Заходи першої допомоги при подразненні органів дихання: при появі ознак подразнення органів дихання необхідно припинити роботу із засобом, потерпілого негайно вивести на свіже повітря або в інше приміщення. Дати йому прополоскати рот і носоглотку водою, дати тепле питво (молоко або воду), при необхідності звернутися до лікаря.

6.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі: при випадковому попаданні засобу в очі необхідно терміново промити їх проточною водою протягом 10-15 хвилин. У разі подразнення слизових оболонок закапати в очі 20-30%-ний розчин сульфацилу натрію (альбуциду), при необхідності звернутися до лікаря.

6.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру: при випадковому попаданні засобу на шкіру потрібно ретельно промити що ділянку проточною водою, після чого змасти шкіру пом'якшувальним кремом.

6.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку: при випадковому попаданні засобу до шлунку необхідно дати потерпілому випити декілька склянок води з 10-20 подрібненими таблетками активованого вугілля, при необхідності звернутися до лікаря.

7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБУ

7.1. Упаковка засобу: засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) випускається у вигляді таблеток у пластикових банках від 20 г до 5 кг; пластикових відрах від 5 кг до 25 кг; інших видах упаковки та розфасовки за потребою замовника.

7.2. Умови транспортування засобу: транспортування засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) здійснюють автомобільним, залізничним, авіаційним або водним транспортом згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів.

7.3. Умови зберігання засобу: засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) зберігають в упаковці виробника, щільно закритим, у темних, критих, сухих складських приміщеннях, які не мають доступу для загального користування.

7.4. Гарантійний термін зберігання засобу: 5 років від дати виготовлення.

8. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

8.1. Контроль засобу: якщо на момент використання цих Методичних вказівок згадані нижче ГОСТ втратять чинність, слід керуватися відповідними ГОСТ або іншими нормативними документами, чинними на момент використання цих Методичних вказівок.

8.1.1. Дезінфекційний засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) контролюють за наступними показниками якості: зовнішній вигляд, колір, запах, середня маса таблеток, час розчинення таблеток у воді, вміст активного хлору в засобі згідно з таблицею 22.

Таблиця 22. Показники якості дезінфекційного засобу «Жавель-Клейд» (таблетки)

Показники якості	Нормативи
Зовнішній вигляд	Таблетки круглої форми, які можуть мати на поверхні насічки для ділення таблетки на частини при приготуванні робочих розчинів
Колір	Білий
Запах	Характерний запах хлору
Середня маса таблеток, г	3,3-3,6
Час розчинення таблеток у воді при $t = 25^{\circ}\text{C}$, хв.	4 максимум
Вміст активного хлору в таблетці, г	1,47-1,62
Вміст активного хлору в засобі, %	45±3

8.1.2. Визначення зовнішнього вигляду, коліору та запаху:

Зовнішній вигляд і колір визначають візуально згідно з ГОСТ 14618.0.

Запах оцінюють органолептично.

8.1.3. Визначення середньої маси таблеток:

8.1.3.1 Засоби вимірювання:

Терези лабораторні (технічні) 2-го класу точності.

8.1.3.2 Виконання вимірювання:

Зважують 10 таблеток, відібраних випадковим чином.

Середню масу таблеток у грамах (M_T) визначають за формулою:

$$M_T = M / N, \text{ де}$$

M – сумарна маса таблеток, які зважували, г;

N – кількість засобу, яку зважували, таблеток.

8.1.4. Визначення часу розчинення таблеток у воді:

У конічну колбу ємністю 500 cm^3 вносять 1 таблетку засобу, наливають 500 cm^3 водопровідної води, вмикують секундомір і при слабкому похитуванні колби відмічають час розчинення таблетки.

8.1.5. Визначення масової частки (вмісту) активного хлору в таблетці здійснюють методом йодометричного титрування на основі методики ГОСТ 11086-76.

8.1.5.1. Засоби вимірювання, реагенти, матеріали:

Терези лабораторні загального призначення за ГОСТ 24104-88, 2-го класу точності, з найбільшою межею зважування 200 г.

Бюветка 1-1-2-25-0,1 за ГОСТ 29251-91.

Піпетки.

Колби конічні, колби мірні.

Циліндри мірні, склянки.

Калій йодистий за ГОСТ 4232; водний розчин з масовою часткою 10%.

Кислота сірчана марки ч.д.а. за ГОСТ 4204-77; водний розчин з масовою часткою 10%.

Стандарт-титр для приготування 0,1 н. водного розчину натрію сіркуватистокислого (натрію тіосульфату) за ТУ 6-09-2540-72, 0,1 н. водний розчин.

Крохмаль розчинний за ГОСТ 10163-76; водний розчин з масовою часткою 0,5% готують за ГОСТ 4517-87 п. 2.90.

Вода дистильована за ГОСТ 6709-72.

8.1.5.2. Виконання вимірювання:

Розчиняють у воді 1 таблетку засобу, переносять кількісно до мірної колби ємністю 250 см³, доводять водою до мітки, ретельно перемішують – розчин 1.

Переносять 5 см³ розчину 1 до конічної колби, додають 20 см³ дистильованої води, 10 см³ йодистого калію та 10 см³ сірчаної кислоти.

Колбу струшують, розчин при цьому набуває коричнево-бурого кольору.

Одержаній розчин титрують за допомогою мірної бюветки 0,1 н. розчином тіосульфату натрію до отримання світло-жовтого забарвлення. Додають 1 см³ крохмалю, розчин при цьому набуває темно-синього кольору. Дотитровують далі 0,1 н. розчином тіосульфату натрію до повного зникнення забарвлення.

8.1.5.3. Опрацювання результатів вимірювання:

Масову частку активного хлору в таблетці у грамах (M_X) обчислюють за формулою:

$$M_X = \frac{V \cdot 0,003545 \cdot 250}{a}, \text{де}$$

V – об'єм розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування, концентрації точно $C(Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O) = 0,1 \text{ моль}/\text{дм}^3 (0,1 \text{ M})$, см³;

0,003545 – маса активного хлору, що відповідає 1 см³ розчину тіосульфату натрію концентрації точно $C(Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O) = 0,1 \text{ моль}/\text{дм}^3 (0,1 \text{ M})$, г;

a – об'єм розчину 1, взятого для титрування, см³.

Результат обчислюють за формулою з округленням до другого десяткового знаку.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне трьох визначень, абсолютноне розходження між якими не повинно перевищувати припустиме значення 0,15 г.

Припустима відносна сумарна похибка результату аналізу становить $\pm 10\%$ при довірчій вірогідності $P=0,95$.

Вміст активного хлору в таблетці у відсотках (С) обчислюють за формулою:

$$C = M_X / M_T \cdot 100\%, \text{де}$$

M_X – масова частка активного хлору в таблетці, г;

M_T – середня маса таблеток, г.

8.2. Контроль робочих розчинів засобу.

8.2.1. Робочі розчини засобу «Жавель-Клейд» (таблетки) контролюють за показником вмісту активного хлору у відсотках. Визначення вмісту активного хлору в розчинах здійснюють методом йодометричного титрування на основі методики ГОСТ 11086-76.

8.2.1.1. Засоби вимірювання, реактиви, матеріали:

Бюветка 1-1-2-25-0,1 за ГОСТ 29251-91.

Піпетки.

Колби конічні, колби мірні.

Циліндри мірні.

Калій йодистий за ГОСТ 4232; водний розчин з масовою часткою 10%.

Кислота сірчана марки ч.д.а. за ГОСТ 4204-77; водний розчин з масовою часткою 10%.

Стандарт-титр для приготування 0,1 н. водного розчину натрію сіркуватистокислого (натрію тіосульфату) за ТУ 6-09-2540-72, 0,1 н. водний розчин.

Крохмаль розчинний за ГОСТ 10163-76; водний розчин з масовою часткою 0,5% готують за ГОСТ 4517-87 п. 2.90.

8.2.1.2. Виконання вимірювання:

У конічну колбу ємністю 100 см³ вносять 10 см³ йодистого калію та 10 см³ сірчаної кислоти, після чого додають кількість робочого розчину засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), що досліджується, згідно з таблицею 23.

Колбу струшують, розчин при цьому набуває коричнево-бурого кольору.

Одержаній розчин титрують за допомогою мірної бюветки 0,1 н. розчином тіосульфату натрію до отримання світло-жовтого забарвлення. Додають 1 см³ крохмалю, розчин при цьому набуває темно-синього кольору. Дотитровують далі 0,1 н. розчином тіосульфату натрію до повного зникнення забарвлення.

Таблиця 23. Кількість робочого розчину засобу «Жавель-Клейд» (таблетки), що береться для дослідження

Концентрація робочого розчину, що досліджується (за активним хлором), %	Кількість робочого розчину, що береться для дослідження, мл
0,01-0,06	70
0,1-0,15	50
0,2-0,3	10
2,0-5,0	5

8.2.1.3. Опрацювання результатів вимірювання:

Вміст активного хлору в розчині засобу у відсотках (K) обчислюють за формуллою:

$$K = \frac{V \cdot 0,003545 \cdot 100}{b}, \text{де}$$

V – об’єм розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування, концентрації точно C(Na₂S₂O₃ · 5H₂O) = 0,1 моль/дм³ (0,1 М), см³;

0,003545 – маса активного хлору, що відповідає 1 см³ розчину тіосульфату натрію концентрації точно C(Na₂S₂O₃ · 5H₂O) = 0,1 моль/дм³ (0,1 М), г;

b – об’єм робочого розчину засобу, взятого для титрування, см³.

Результат обчислюють за формуллою з округленням до третього десяткового знаку.

За результатом аналізу приймають середнє арифметичне трьох визначень, абсолютне розходження між якими не повинно перевищувати припустиме значення 0,001%.

Припустима відносна сумарна похибка результату аналізу становить ±10% при довірчій вірогідності P=0,95.



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію
дезінфекційного засобу

№ 05.03.02-08/1458

від 18.02.2016 р.

Дезінфекційний засіб «Жавель-Клейд» (таблетки)

(назва дезінфекційного засобу)

Натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – 80,0-82,0%

(вміст діючих речовин)

ТОВ "Торговий дім "Санітарний щит України", Україна, 02152, м. Київ, вул. Березніїківська, 10, кв. 17, тел./факс: (044) 404-04-54, 404-90-27, office@sans.com.ua, www.sans.com.ua, код ЄДРПОУ: 33888590

(заявник, повне найменування, місцезнаходження)

Фірма "Hydrachim", Франція, Route de Saint Poix, 35370, Le Pertre, France, tel: +33 (0)2 99 96 80 08, fax: +33 (0)2 99 96 82 00, www.hydrachim.com

(виробник, повне найменування, місцезнаходження)

Дезінфекція у закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, вогнищах інфекційних захворювань, аптечних, лікарських, навчально-виховних, соціального захисту, герiatricих закладах, місцях постійного та тимчасового проживання, офісах, спортивно-оздоровчих комплексах, місцях проведення спортивних змагань і тренувань, басейнах, аквапарках, саунах, лазнях, на об'єктах комунально-побутового призначення, в адміністративних і громадських закладах, банківських установах, закладах зв'язку, культури та відпочинку, готельного та ресторанного господарства, торгівлі, місцях масового скучення людей, громадських туалетах, на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчопереробної промисловості, цукрової та спиртової галузей, водопостачання та водовідведення, агропромислового комплексу, промислових підприємствах, у санітрохімічних, складах і сховищах, на підприємствах з переробки сміття, рухомому складі та об'єктах забезпечення автомобільного транспорту, метрополітену, залізничного, водного, наземних об'єктах повітряного транспорту, об'єктах міністерств, служб і відомств, митниць та прикордонних служб, установ пенітенціарної системи, інших епідемічно значимих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекцій робіт; дезінфекція, суміщенна з дестерилізаційним очищеннем, виробів медичного призначення, інструментарію, аптечного та лабораторного посуду, скла; заповнення дезінфекційних бар'єрів; обробка поверхонь з метою знищення та попередження появи пілісняви; знезареждання води, дезінфекція систем і окремих об'єктів водопостачання при централізованому, автономному та нецентралізованому (місцевому) водопостачанні; знезареждання стічних вод, дезінфекція систем і окремих об'єктів водовідведення; дезінфекція колодязів та знезареждання води в них; знезареждання води в плавальних басейнах.

(оферта застосування)

Згідно з методичними вказівками від 17.02.2016 №662-2016

(використання згідно з)

Свідоцтво видане на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.02.2016р. № 05.03.02-03/3893 проведеної уповноваженою установою, закладом державної санітарно-епідеміологічної служби – Державна Установа "Інститут медицини праці НАМН України"

(повне найменування установи/закладу)

Свідоцтво дійсне до: 18.02.2021

Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря
України

М.П.



С.В. Протас

(ініціали та прізвище)



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(назва установи)
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖЮЮ

**Заступник головного державного
санітарного лікаря України**



S.V. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.02. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 3893

Дезінфекційний засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) (дюча речовина: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – 80,0-82,0 %)

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3808 942000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

Дезінфекція у закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, вогнищах інфекційних захворювань, аптечних, дитячих, навчально-виховних, соціального захисту, геріатричних закладах, місцях постійного та тимчасового проживання, офісах, спортивно-оздоровчих комплексах, місцях проведення спортивних змагань і тренувань, басейнах, аквапарках, саунах, лазнях, об'єктах комунально- побутового призначення, в адміністративних і громадських закладах, банківських установах, закладах зв'язку, культури та відпочинку, готельного та ресторанного господарства, торгові, місцях масового скupлення людей, громадських туалетах, на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчопереробної промисловості, цукрової та спиртової галузей, водопостачання та водовідведення, агропромислового комплексу, промислових підприємствах, у санпропускниках, складах і склади, на підприємствах з переробки сміття, рухомому складі та об'єктах забезпечення автомобільного транспорту, метрополітену, залізничного, водного, наземних об'єктах повітряного транспорту, об'єктах міністерств, служб і відомств, митниці та прикордонних служб, установ пінгвінціарної системи, інших епідемічно значимих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт; дезінфекція, суміщеня з дестерилізаційним очищеннем, виробів медичного призначення, інструментарію, аптечного та лабораторного посуду, скла; заповнення дезінфекційних бар'єрів; обробка поверхонь з метою знишення та попередження появі пліснів; знезараження води, дезінфекція систем і окремих об'єктів водопостачання при централізованому, автономному та нецентралізованому (місцевому) водопостачанні; знезараження стічних вод, дезінфекція систем і окремих об'єктів водовідведення; дезінфекція колодязів та знезараження води в них; знезараження води в плавальніх басейнах; дезінфекція поверхонь шкаралупи товарних (харчових) яєць тощо. Державна реєстрація

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "Hydrachim", Франція, Route de Saint Poix, 35370, Le Pertre, France,
tel: +33 (0)2 99 96 80 08, fax: +33 (0)2 99 96 82 00, www.hydrachim.com

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Торговий дім "Санітарний щит України", Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 10, кв. 17,
тел./факс: (044) 404-04-54, 404-90-27, office@sans.com.ua, www.sans.com.ua, код ЄДРПОУ: 33888590

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Засіб належить до III класу помірно небезпечних речовин при введенні у шлунок, IV класу малонебезпечних сполук при нанесенні на шкіру; не чинить подразнюючої дії на шкіру та сенсибілізуючої дії згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Система безпасності труда. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСВА. Класифікация и общие требования безопасности». ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони (mg/m^3) не більше: хлору вільного – 1,0 (п); натрію карбонату (соди кальцинованої) – 2,0 (а); кислоти адипінової – 4,0 (а) згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". ГДК (ОБРВ) токсичні елементи, які виділяються в атмосферне повітря (mg/m^3) не більше: хлору вільного – 0,1 (м.р.), 0,03 (с.д.); натрієвої солі дихлорізоціанурової кислоти – 0,03; натрію карбонату (соди кальцинованої) – 0,04; кислоти адипінової – 0,05 згідно з ДСТ 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)", ГН 2.2.6-184-2013 "Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітря населених місць". ГДК шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування: відсутність (за активним хлором); натрієвої солі дихлорізоціанурової кислоти – 0,2 мг/л; кислоти адипінової – 2,0 мг/л згідно з СанПіН 4630-88 "Санітарні правила і норми охорани поверхневих вод від затримання". За параметрами гострої токсичності при введенні у шлунок засіб відноситься до 3 класу помірно небезпечних речовин, при нанесенні на шкіру та у умовах інгаляційної дії у вигляді пари – до 4 класу малонебезпечних речовин згідно з ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Класификация и общие требования безопасности".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Діюча речовина: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – 80,0-82,0%. Засіб має: бактерицидну (включаючи туберкульоз), вірусцидну, фунгіцидну, споропаціду, овінцидну дію та міайні властивості. Призначенння: для проведення профілактичної, поточній, заключної дезінфекції об'єктів; дезінфекції сумішеної з дестерилізаційним очищеннем, виробів медичного призначенні тощо; зневажлення води, дезінфекції систем і окремих об'єктів водопостачання та водовідведення; зневажлення води в плавальних басейнах у зачленений сфері застосування. Режими використання: робочі розчини засобу у концентраціях: 0,0025-0,3; 2,0; 3,0; 5,0% (за активним хлором), експозиція: 2; 5; 10-360 хв.; вміст залишкового вільного хлору при зневажленні води 0,3-0,5; 1,4-1,6 мг/дм³.

Продукцію використовують виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Застосування засобу потребує використання індивідуальних засобів захисту: роботи з приготування та застосування робочих розчинів засобу "Жавель-Клейд" (таблетки) концентрації до 0,1% (за активним хлором) виключно слід проводити у захисному одязі з використанням засобів захисту шкіри. Роботи з приготування та застосування розчинів засобу "Жавель-Клейд" (таблетки) концентрації вище 0,1% (за активним хлором), спещоядя згідно ГОСТ 12.4.103 гумові рукавички згідно ГОСТ 2-ІО 10, універсалні респіратори типу РУ-60М, для захисту очей – захисні окуляри типу ПОР-2, ПО-3 чи моноблок. При роботі з засобом необхідно дотримуватися правил особистої гігієни. Забороняється пити, палити чи приймати їжу на робочому місці. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттезбирника. У торговельний мережі продукція з вичерпанням терміном придатності або некондіційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробника.

(обсягові умови використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Дезінфекційний засіб «Жавель-Клейд» (таблетки) (діюча речовина: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – 80,0-82,0%), за наданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності: гарантуються виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 15.02.2021 р. (державна реєстрація)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачє силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на корлоні)



згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при магістральному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий
 (показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
 НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
 прямальня: (044) 284-34-27, e-mail:
 yik@nanu.kiev.ua;
 секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
 e-mail: test-lab@ukr.net
 (найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

№ 2014 від 15.02.2016р.

(о бротоколу, даті його затвердження)

Чернюк В.І.



«Жавель-Клейд» (таблетки)

Сучасний дезінфекційний засіб виробництва Франції

Переваги засобу «Жавель-Клейд» (таблетки)

1. СУЧАСНИЙ:

- **діюча речовина** знаходиться у зв'язаному стані та без контакту з водою не розпадається з утворенням вільного хлору;
- **допоміжні речовини** зв'язують та стабілізують діючу речовину, підвищують її антимікробну дію, забезпечують високу розчинність засобу, пом'якшують воду, знижують фіксуючу та корозійну активність хлору.

2. УНІВЕРСАЛЬНИЙ за спектром антимікробної дії, ефективно знищує:

- **бактерії** (у т.ч. мікобактерій туберкульозу, кишкову та синьогнойну палички);
- **віруси** (у т.ч. ВІЛ, віруси гепатитів, грипів, герпесу, поліоміеліту);
- **грибки** (кандидози, дерматомікози);
- **плісняві гриби та спори;**
- **збудників внутрішньої лікарняних інфекцій;**
- **збудників особливо небезпечних інфекцій.**

3. ЗРУЧНИЙ у застосуванні:

- добре розчиняється у воді;
- не потребує використання терезів, мірок та інших дозувальних ємностей;
- не потребує підігріву води та додавання допоміжних речовин;
- не утворює «хлорного пилу» при приготуванні розчинів.

4. БЕЗПЕЧНИЙ для людей та навколошнього середовища:

- належить до мало небезпечних речовин при вдиханні та попаданні на шкіру;
- не має віддалених наслідків для здоров'я;
- не має різкого запаху;
- дозволяється до застосування у присутності сторонніх осіб.

5. ЕКОНОМІЧНИЙ:

- має високу ефективність при низьких нормах витрати;
- значно дешевший у застосуванні, ніж інші дезінфектанти;
- **1 кг засобу – дезінфекція до 45,5 тис. м² поверхонь.**

6. СТАБІЛЬНИЙ:

- не вимагає особливих умов зберігання та контролю активного хлору;
- не втрачає своїх властивостей під час зберігання та транспортування;
- **гарантійний термін зберігання – 5 років від дати виготовлення.**

7. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ: засіб та його розчини можна застосовувати будь-якими методами з використанням будь-якого обладнання (інвентарю для ручної обробки, розпиловачів, генераторів туману, у циркуляційних системах тощо).

8. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ: має державну реєстрацію та відповідні дозволи.

