

ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 24.12.2019 № 12.2-18-1/28755



Красько О.О.
«27» грудня 2019 р.

**Інструкція
щодо застосування засобу
«Bilysna anti fungus (Білизна анти пліснява)»**

Ця інструкція визначає умови застосування засобу «Bilysna anti fungus (Білизна анти пліснява)» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001) для видалення плісняви з поверхонь у лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в училищах та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«Bilysna anti fungus (Білизна анти пліснява)» - готовий засіб для видалення пліснявих грибів з поверхонь.

Склад засобу, мас.%: перекис водню (активний кисень) – 10, катіонні ПАР – 5, лимонна кислота < 5, вода.

«Bilysna anti fungus (Білизна анти пліснява)» - ефективно видаляє плісняву з різних видів поверхонь: кахлі, міжкахельні шви, дерево, камінь, штукатурка, шпалери, шкіра. Засіб ефективно бореться з пліснявою на поверхнях душових кабін, занавісок, перегородок. Засіб може застосовуватись для видалення плісняви в підвальних приміщеннях, гаражах, внутрішніх та зовнішніх поверхонь приміщень, віконних стиків, саунах та банях. Можливість обробки холодильного обладнання з метою профілактики та знищення плісняви на його внутрішніх та зовнішніх поверхнях.

Умови використання засобу: рясно змочити засобом пошкоджені пліснявою поверхні та витримати 30-60 хв. Всі відшаровані частини, обережно зняти щіткою або губкою після обробки засобом. Після чого змити поверхні проточною водою. У випадку сильного ураження поверхонь пліснявим грибком, рекомендована повторна обробка.

Особливості застосування: всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру. Для запобігання розповсюдження спор пліснявих грибів, не рекомендується знімати уражені частини поверхонь до обробки засобом.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони по 1000 мл, 750 мл з піноутворюючим розпилювачем та каністри по 5 л. Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних пристрій та прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Дата останнього перегляду
Інженер з якості
ТОВ «Бланідас»

Плахотнюк М.О.
«27» лістопада 2019 р.